



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
FACULTAD DE ENFERMERÍA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

RESUMENES DE INVESTIGACIONES 2006-2008



IQUITOS - PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE ENFERMERIA
DIRECCION DE INVESTIGACION
Psje. Dina Límaco, 186. PPJJ Túpac Amaru
Iquitos- Perú
Teléfono: 0051-65-266368
0051-65-268296

Directorio de la Dirección de Investigación

Dra. Maritza E. Villanueva Benites (Directora)
Mgr. Rossana Torres Silva
Mgr. Perla M. Vásquez Da Silva
Mgr. Juana Gutiérrez Chávez
Mgr. Marina Guerra Vásquez

Comité Revisor Resúmenes de Tesis 2006- 2008

Dra. Maritza Villanueva Benites
Mgr. Rossana Torres Silva
Mgr. Zoraida Silva Vásquez
Mgr. Juana Gutiérrez Chávez

Iquitos, Enero 2010

Presentación

El libro Resúmenes de Investigaciones 2006-2008, da cuenta de las investigaciones básicas realizadas por 146 tesis para optar la Licenciatura en Enfermería, el cual pone en evidencia el interés de la gestión en difundir los variados aportes de los tesis de la Facultad de enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

Este libro incorpora como parte de su contenido una serie de investigaciones en VIH/Sida/Comportamiento sexual, salud reproductiva, enfermedades transmisibles, calidad de la atención, gerontología, violencia familiar, sexual y de género y anticoncepción. Todos ellos con la finalidad de aportar y transferir los resultados de la investigación a las áreas de docencia, extensión y proyección universitaria.

La misión de este libro es el de ofrecer un espacio de difusión de los aportes de los investigadores iniciales de nuestra casa de estudios, que favorezca su utilización en la generación de nuevas ideas de investigación y la profundización en las diferentes temáticas abordadas.

Para alcanzar las metas señaladas, se promueve su consulta en la Dirección de Investigación, en la biblioteca especializada de la Facultad de Enfermería y en el portal web de la UNAP en formato pdf.

Ruth Vílchez Ramírez

Decana

INDICE

	Pag:
Factores socioculturales y de comportamiento sexual asociados a Infecciones de Transmisión Sexual de manejo sindrómico en mujeres atendidas en hospitales del MINSA Iquitos, 2008	8
Factores gineco-obstetricos y personales, relacionados al Cáncer de Mama en mujeres atendidas en hospitales del ministerio de salud, Iquitos- 2008	9
VARIABLES asociadas a la autoestima en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa “Colegio Nacional Iquitos”. 2008	10
Modelo de intervención educativa en el nivel de conocimiento del uso adecuado del preservativo en estudiantes de institución educativa secundaria Maynas. Iquitos – 2008.	11
Factores psicosociales y desempeño laboral del profesional de enfermería del área de Pediatría de los hospitales de la ciudad de Iquitos – 2008	12
Cuidado del enfermero(a) y la satisfacción del paciente hospitalizado en servicio de cirugía del Hospital regional de Loreto, Iquitos – 2008.	13
Factores biopsicosociales y síntomas depresivos en adolescentes del Colegio Nacional Iquitos. 2008.	14
Calidad de atención del profesional de enfermería y satisfacción de los usuarios del Hospital Regional de Loreto Iquitos – 2008	15
VARIABLES demográficas, culturales y actitudes de los adolescentes hacia el embarazo precoz en el AA.HH. Juan Carlos del Águila Iquitos – 2008”	16
Características demográficas y económica relacionados a conocimiento sobre VIH/SIDA y conducta sexual en estudiantes del nivel secundario, Iquitos – 2008	17
Masculinidad y violencia conyugal en estibadores de la Empresa Nacional de Puertos Iquitos- 2008	18

Factores biopsicosociales y culturales relacionados a prácticas de Autocuidado en mujeres pre menopáusicas del AA. HH. Los Delfines, San Juan. 2008.	19
Características socio económicas, culturales y conocimiento sobre alimentación complementaria en madres de niños/as de 6 a 12 meses atendidos/as en el Centro de Salud de Moronacochoa, Iquitos - 2008	20
VARIABLES asociadas a actitudes hacia el consumo de drogas en internos de los centros de rehabilitación de Iquitos – 2008	21
Efectos de una intervención educativa sobre embarazo en la adolescencia y el nivel de conocimiento. San Juan 2008	22
Factores sociales y maltrato en escolares del AA.HH. 9 de abril. Distrito San Juan – 2008	23
Factores biopsicosociales y culturales relacionados a la calidad de vida de personas viviendo con VIH/SIDA. Hospital Regional de Loreto. 2008	24
Conocimiento y actitud sobre métodos anticonceptivos en estudiantes de la Facultad de Enfermería Iquitos-Perú. 2007	25
Conocimiento sobre VIH/Sida y comportamiento sexual en homosexuales atendidos en el centro de salud San Juan - 2007	26
Conocimiento y actitudes asociados al uso del condón en estudiantes de instituciones secundarias Iquitos - 2007	27
VARIABLES tiempo y lugar asociados a la prevalencia de malaria en la Región Loreto periodo 2001 al 2006. Iquitos - 2007	28
Factores modificables relacionados a la capacidad funcional del adulto mayor del albergue San Francisco de Asís Iquitos – 2007	29
VARIABLES socios demográficos y culturales y Autocuidado en Leptospirosis en pobladores de “Los Delfines”, Iquitos – 2007.	30
Factores socio demográficos y psicológicos relacionados al intento de suicidio en pacientes atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud. Iquitos- 2007	31
Cuidados de enfermería e infecciones nosocomiales en los servicios: Uci-cirugía y Cirugía. HRL 2007	32
Nivel de conocimiento y prácticas de bioseguridad en estudiantes de enfermería UNAP. Iquitos – 2007	33
Factores ginecoobstétricos y Neoplasia Intraepitelial Cervical en	34

mujeres atendidas en el servicio de Ginecología del Hospital Regional Iquitos – 2007	
Condiciones del cuidador informal relacionado al grado de dependencia del adulto mayor de Padomi. Hospital III - EsSalud Iquitos – 2007	35
Factores socio demográficos y psicológicos relacionados a la violencia física de la mujer del departamento de familia – PNP, Iquitos – 2007	36
Efecto de un programa educativo sobre saneamiento básico del agua y prácticas sanitarias en pobladores del AA HH “31 de mayo” Iquitos – 2007	37
Variables socio demográficas asociadas a los conocimientos y actitudes sobre VIH/ Sida en docentes de la institución educativa Mariscal Oscar R. Benavides. Iquitos - 2007	38
Autoestima, funcionalidad familiar y cumplimiento del tratamiento en la estrategia sanitaria de prevención y control de tuberculosis en los hospitales del Ministerio de salud. 2007	39
Nivel de conocimiento y actitudes hacia la violencia conyugal en mujeres del distrito de Belén - Maynas 2007	40
Efectos de una intervención educativa: nivel de conocimiento y actitud de pacientes frente al tratamiento anti malárico del centro de salud San Juan, Iquitos - 2006	41
Características familiares asociadas al desarrollo psicomotriz del niño de 3 a 5 años del Distrito de Belén – Zona Baja, 2006	42
Calidad de atención y nivel de satisfacción de usuarios externos de los servicios materno infantil, Hospital Regional de Loreto, Iquitos, 2006	43
Factores maternos relacionados a Hipertensión inducida por el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital Regional de Loreto. 2000-2005	44
Factores biológicos –ambientales y Autocuidado en adultos hipertensos del Hospital III EsSalud, Iquitos -2006”	45
Factores socio demográficos, culturales y parasitosis intestinal en niños de la institución educativa inicial n° 342 Micaela Bastidas, Iquitos, 2006	46
Factores de riesgo cardiovascular asociados a enfermedad coronaria en pacientes del consultorio de medicina del Hospital	47

Iquitos III EsSalud 2006	
Conocimientos y actitudes sobre explotación sexual infantil asociadas a variables socio demográficas en estudiantes de una institución educativa secundaria Iquitos – 2006	48
Factores psicológicos y socio demográficos asociados al trastorno depresivo en consultorios de psiquiatría y psicología, Hospital Regional de Loreto Iquitos-2006	49
Factores psicosociales relacionados con el inicio precoz de la actividad sexual en adolescentes de 4to y 5to de secundaria de la ciudad de Iquitos 2006	50
Nivel de conocimiento y conducta sexual en adolescentes de instituciones educativas secundarias mixtas, distrito de Iquitos 2006	51
Factores de riesgo materno y complicaciones materno perinatales del trabajo de parto en el hospital regional de Loreto Iquitos-2006	52
Características socio demográficas y nivel de percepción de la calidad de atención del profesional de enfermería del paciente egresado de cirugía, Hospital Iquitos. 2006	53
Factores maternos, perinatales y Sepsis Neonatal en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Regional de Loreto. Iquitos- 2006	54
Factores intrínsecos–extrínsecos y caídas del adulto mayor atendidos en el Hospital Regional de Loreto	55
Nivel de conocimiento y actitud sobre la anticoncepción oral de emergencia en adolescentes de colegios secundarios, Iquitos – 2006	56
Factores de riesgo relacionado al nivel de conocimiento sobre sífilis y gonorrea en adolescentes del AA. HH Ciudad – Jardín, Iquitos - 2006	57
Nivel de conocimiento relacionado al Autocuidado de mujeres en perimenopausia de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos 2006	58

Título: Factores socioculturales y de comportamiento sexual asociados a Infecciones de Transmisión Sexual de manejo sindrómico en mujeres atendidas en hospitales del MINSA Iquitos, 2008

Autoras: Calderón Rodríguez, Karla V.; Granja Carihua Carlos D. y Saavedra Yahuarcani, Felicita.

Asesores: Chuquipiondo Carranza, Carmen y Zapata Vásquez, Eliseo.

Código SX22-2

Resumen

El objetivo de este estudio fue determinar la asociación que existe entre los factores socioculturales y de comportamiento sexual, con las Infecciones de Transmisión Sexual de manejo sindrómico, en mujeres atendidas en hospitales del MINSA Iquitos, 2008. El método empleado fue el cuantitativo, diseño transversal, descriptivo, correlacional. La muestra estuvo constituida por 200 mujeres a quienes se aplicó una ficha de registro de casos y un cuestionario estructurado. Los datos se analizaron a través del SPSS versión 15.0, en la estadística inferencial se aplicó la prueba Chi cuadrado. Los resultados mostraron que el 45% eran adultas jóvenes, 29.5% adolescentes, 48% reportaron ser solteras, separadas con y sin hijos, 44.5% amas de casa. El 97% informó inicio de relaciones sexuales en forma precoz, 49.5% eran polígamas con dos o mas parejas sexuales, 56% no usa preservativos en relaciones coitales y practica relaciones de alto riesgo (vaginal, anal, oral sin protección). Respecto a infecciones de transmisión sexual 78,5% tuvieron síndrome de flujo vaginal, 21,5% úlcera genital. Las variables que evidenciaron asociación estadísticamente significativa con las Infecciones de transmisión sexual fueron: grado de instrucción ($p=0.034$), ocupación ($p=0.007$), inicio precoz de relaciones sexuales ($p=0.025$), prácticas sexuales ($p=0.012$).

Palabras clave: Infecciones de Transmisión Sexual- mujer.

Título: Factores gineco-obstétricos y personales, relacionados al Cáncer de Mama en mujeres atendidas en hospitales del ministerio de salud, Iquitos- 2008

Autoras: Pérez Serrantes; Cinthia K.; Ruiz Macedo, Maritza L.; Yhuaraqui Zumba, Susana.

Asesores: Vílchez Ramírez Ruth y Zapata Vásquez, Eliseo
Código MI-85-2

Resumen

La finalidad de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre los factores gineco-obstétricos, personales y el cáncer de mama, en mujeres atendidas en hospitales del Ministerio de Salud de Iquitos entre 2005 a 2008. Se empleó el método cuantitativo, descriptivo correlacional retrospectivo, la muestra estuvo conformada por 115 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama; se aplicó una ficha de cotejo (validez=0.96, confiabilidad=0.75). Para verificar las hipótesis de estudio se utilizó la prueba Chi-cuadrada, con nivel de significancia de 5% ($\alpha = 0.05$) y un valor de $p < 0.05$. Los hallazgos señalaron que 49.6% mujeres presentaron menarquía temprana, 44.3% edad temprana para el primer embarazo a término, 84.3% eran multíparas, 50.4% presentaron edad tardía al momento del diagnóstico, 70.4% fueron obesas, 79.1% usó anticonceptivos hormonales, 73.0% con antecedente familiar y 75.7% antecedente de patología mamaria. El 63.48% presentó cáncer de mama avanzado y 36.52% en inicio. Las variables que mostraron asociación al cáncer de mama fueron: edad al momento del diagnóstico ($p = 0.000$), obesidad ($p=0.003$), uso de anticonceptivos hormonales ($p=0.012$), antecedente familiar ($p=0.001$) y antecedente de patología mamaria ($p=0.010$).

Palabras clave: Cáncer de mama

Título: Variables asociadas a la autoestima en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa “Colegio Nacional Iquitos 2008.

Autoras: Cabudivo Flores, Melissa M.; Souza Flores, Jessy C. y Saboya Cárdenas, Diana.

Asesores: Silva Acosta, Zoraida y Zapata Vásquez, Eliseo
Código PS-35-2

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre las variables: sexo, religión, conocimiento sobre autoestima, rol de los amigos, influencia de los medios de comunicación y funcionalidad familiar con el nivel de autoestima de estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa “Colegio Nacional Iquitos” durante el año 2008. Se utilizó el diseño descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 220 estudiantes de ambos sexos, entre 15 y 19 años. Se aplicó un cuestionario sobre conocimiento en autoestima (confiabilidad=0.71), escala para evaluar el rol de los amigos (confiabilidad=0.71), una escala de influencia de los medios de comunicación en la Autoestima (validez=0.100, confiabilidad= 0.84), escala de autoestima (validez= 0.78, confiabilidad=0.75) y el APGAR Familiar (validez=0.85, confiabilidad=0.82). Los hallazgos mostraron que 60.9% era de sexo masculino, 39.1% femenino, 71.8% perteneció a alguna organización religiosa, 80.0% presentaron conocimiento adecuado de autoestima, 90,9% informó influencia de amigos, 75.0% no adquirió influencia de los medios de comunicación, 31.8% con familia disfuncional, 70.5% autoestima alta. Las variables asociadas con la autoestima fueron conocimiento sobre autoestima ($p=0.000$), rol de amigos ($p=0.023$) y funcionalidad familiar ($p=0.005$).
Palabras clave: autoestima- adolescentes

Título: Modelo de intervención educativa en el nivel de conocimiento del uso adecuado del preservativo en estudiantes de institución educativa secundaria Maynas. Iquitos – 2008.

Autores: Panaifo Gurmendi, Anthony F.; Zúñiga Ríos, Raquel J. y Ramírez Guzmán, Héctor.

Asesores: Orbe Gaviola Zulema y Ávila Zavaleta, Wilson.
Código SX-20-2

Resumen

Con la finalidad de determinar el efecto de un modelo de educativo en el nivel de conocimiento del uso adecuado del preservativo en estudiantes de quinto año de secundaria, se realizó un estudio con diseño cuasi experimental de tipo pre – prueba y post prueba, con un grupo Experimental y un grupo control. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes del 5to año de secundaria, 30 de ellos pasaron a formar parte del grupo experimental y 30 del grupo control. Las técnicas empleadas fueron: entrevista, charla educativa, demostraciones y redemostraciones. Para la recolección de los datos se aplicó un cuestionario Pre y Post Test (validez=0.85 y confiabilidad =0.98). Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 15, en el análisis inferencial se empleó la prueba “t” Student. Resultados: en el pre test, la media aritmética del grupo control fue de 17.93 ± 4.0 , mientras que la media del grupo control fue de 19.27 ± 3.38 ($p > 0.05$); mientras que en el post test, la media aritmética obtenida por el grupo experimental fue de 25.1 ± 2.26 puntuación más alta que el grupo control de 17.93 ± 3.87 ($t_c = -8.78$ y $p = 0.000$). Los hallazgos permiten afirmar que la aplicación del modelo educativo tiene efectos significativos en el incremento del conocimiento sobre uso adecuado del preservativo en estudiantes de secundaria.

Palabras clave: educación para la salud- anticoncepción

Título: Factores psicosociales y desempeño laboral del profesional de enfermería del área de Pediatría de los hospitales de la ciudad de Iquitos – 2008.

Autores Casique de la Cruz, Wendy M.; Díaz García, Rodolfo C. y Ramírez Flores, Grace C.

Asesora: Matute Panaifo Eva L.

Código MI-84-2

Resumen

La presente investigación, tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre el estrés laboral, satisfacción laboral e interacción social con el desempeño laboral del profesional de enfermería que labora en el área de pediatría del Hospital Regional de Loreto, Hospital Apoyo Iquitos y Hospital III EsSalud de la ciudad de Iquitos 2008. Se utilizó un diseño descriptivo correlacional y transversal. A 44 profesionales de enfermería del área de pediatría se aplicó el Test de Evaluación de Factores Psicosociales y el registro observacional del desempeño laboral (validez=0.77 y confiabilidad en estrés laboral (0.88), satisfacción laboral (0.85), interacción social (0.815) y en desempeño laboral (0.67). En el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 15.0 se utilizó la prueba estadística del coeficiente de correlación biserial (r_b). El profesional de enfermería presenta estrés leve (56,82%), satisfacción (86,4%), interacción social (84.1%) y deficiente desempeño laboral (90,9%). Se encontró asociación estadísticamente significativa entre las variables estrés laboral, satisfacción laboral, interacción social y el desempeño laboral ($p<0.01$)

Palabras clave: desempeño laboral- enfermería

Título: Cuidado del enfermero(a) y la satisfacción del paciente hospitalizado en servicio de cirugía del Hospital regional de Loreto, Iquitos – 2008.

Autores: Hidalgo Rojas, Lila V.; Morales Tangoa, Katia K.; Vargas Pinedo, Milagros.

Asesora: Gutiérrez Chávez Juana y Zapata Vásquez Eliseo.

Código MQ-42-2

Resumen

EL objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre el cuidado del enfermero y la satisfacción del paciente hospitalizado en Cirugía. Se empleó un diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional transversal, la muestra estuvo conformada por 196 pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía determinada por afijación proporcional; se utilizaron una ficha de percepción del cuidado del enfermero (validez=0.98, confiabilidad=0.79 y la ficha de satisfacción del usuario (confiabilidad=0.86). Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 15.0. El 55.1% de los pacientes tenían entre 19 a 35 años de edad, 56% eran mujeres, 77.6% proceden de Iquitos, 99.5% fueron informados del diagnóstico médico, 53.1% tenía 2 a 5 días de estancia hospitalaria. El 98.5% manifestó que el tratamiento brindado por enfermería era adecuado, 63.3% calificó al tratamiento farmacológico adecuado. El 100% mostró percepción adecuada del cuidado de enfermería, 77% manifiesta satisfacción con el cuidado de enfermería. Se encontró relación estadística significativa entre el cuidado del enfermero, trato, tratamiento y consentimiento informado y la satisfacción del paciente ($p < 0.01$)

Palabras clave: satisfacción usuario- enfermería.

Título: Factores biopsicosociales y síntomas depresivos en adolescentes del Colegio Nacional Iquitos. 2008.

Autoras: Paredes Soplín Ivonne E.; Falcón Emma, Rocío y Cevallos Álvarez, Lady D.

Asesores: Guerra Vásquez, Marina y Zapata Vásquez Eliseo

Código PS-32-1

Resumen

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la relación que existe entre algunos factores biopsicosociales y síntomas depresivos en adolescentes de 4to y 5to de secundaria. Se empleó un diseño descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 225 estudiantes, el muestreo fue probabilístico estratificado. La técnica empleada fue la encuesta de tipo auto administrada y los instrumentos aplicados fueron: APGAR Familiar (validez= 0.85, confiabilidad=0.80) Autoestima (validez=0.85, confiabilidad=0.82), Test de Tamizaje de depresión (validez=0.85, confiabilidad=0.75). Los datos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS versión 15.00. El 50.2% de la muestra era del sexo femenino, la edad de mayor frecuencia fue de 16 años con 42.3%, seguido del 41.4% de 15 años. 74.2% presentaron autoestima baja, 37.3% informaron disfunción familiar leve, 20.9% disfunción familiar moderada y severa. Al relacionar las variables entre factores biopsicosociales (sexo, edad, autoestima y funcionalidad familiar) y síntomas depresivos se encontró relación estadística significativa entre síntomas depresivos y las variables: sexo ($p= 0.043$) y Autoestima ($p= 0.007$), Funcionalidad Familiar ($p= 0.004$).
Palabras clave: depresión- adolescentes

Título: Calidad de atención del profesional de enfermería y satisfacción de los usuarios del Hospital Regional de Loreto Iquitos – 2008.

Autoras: Sanchez Arbaiza, Neri N.; Cachique Arirama, Martha y Jesús Sinti, Liz M.

Asesores: Silva Acosta Zoraida, Zapata Vásquez, Eliseo

Código MQ-43-2

Resumen

El propósito del presente trabajo de investigación fue determinar la relación que existe entre la calidad de atención del profesional de enfermería y la satisfacción del cliente hospitalizado en los servicios de Cirugía y Medicina del Hospital Regional de Loreto. Se utilizó un diseño transversal, descriptivo, correlacional; la muestra probabilística conformada por 200 pacientes hospitalizados en los servicios de Cirugía y Medicina del Hospital Regional de Loreto. Se aplicaron un cuestionario de características socio demográficas, cuestionario de calidad de atención, dividida en 4 indicadores (Humanizada, Óptima, Continua y Segura), validez=0.98 y confiabilidad=0.76, escala de Satisfacción de usuario, validez=0.97 y confiabilidad=0.77%. Para el análisis de datos se utilizó la prueba estadística Chi cuadrada, el paquete estadístico SPSS versión 15.0. Respecto a la Calidad de Atención Humanizada, el 87% manifestaron que fue buena, referente a la calidad de Atención Óptima el 85% calificó como buena y el 15% como regular; mientras que en la Calidad de Atención Continua, el 51 calificó como buena; en relación con la calidad de Atención Segura, el 71% sostiene que fue regular. Existe relación estadísticamente significativa entre las variables estudiadas y la satisfacción del cliente hospitalizado ($p < 0.05$)

Palabras clave: satisfacción del usuario.

Título: Variables demográficas, culturales y actitudes de los adolescentes hacia el embarazo precoz en el AA.HH. Juan Carlos del Águila Iquitos – 2008

Autoras: García Panduro, Marilyn J.; Melendez Ruiz, Salvith K.; Ramírez Huani, Clara L.

Asesores: Silva Acosta Zoraida, Zapata Vásquez, Eliseo

Código MI-87-2

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre las Variables Demográficas - Culturales y las Actitudes de los Adolescentes hacia el Embarazo Precoz en un asentamiento humano de Iquitos. El método empleado fue el cuantitativo, descriptivo correlacional. La muestra estuvo constituida por 232 adolescentes entre 10 a 19 años de edad. utilizaron 3 instrumentos: un cuestionario validez= 0.86 y confiabilidad 0.98, escala de Actitud validez=0.86 y confiabilidad de 0.98 para medir conocimiento sobre embarazo precoz y comportamiento sexual y el Apgar Familiar. Los datos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS versión 15.0. Los hallazgos mostraron que el 36.5% de sujetos tienen entre 15 y 19 años, 51.3% son mujeres, 65.5% residen en zonas urbanas. El 59.5% presenta conocimiento adecuado (>70% respuestas correctas), 19.8% muestra comportamiento sexual de bajo riesgo y 14.7% de alto riesgo, el 86.6% manifiesta disfuncionalidad familiar predominando la disfunción leve en el 59.9%, el 77% muestra actitud de rechazo hacia el embarazo precoz. Se determinó que existe asociación estadísticamente significativa entre la procedencia comportamiento sexual, funcionalidad familiar y actitud hacia el embarazo precoz ($p < 0.05$) y entre el nivel de conocimiento y actitud hacia el embarazo precoz ($p < 0.05$).

Palabras clave: embarazo precoz- adolescencia.

Título: Características demográficas y económica relacionados a conocimiento sobre VIH/SIDA y conducta sexual en estudiantes del nivel secundario, Iquitos - 2008

Autoras: Vargas Guevara, Karin V.; Chávez Angulo Vanessa y Rengifo Rojas, Karin.

Asesores: Gutiérrez Chávez, Juana y Zapata Vásquez Eliseo

Código SX-21-2

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre las características demográficas, económicas con el conocimiento sobre VIH/SIDA y conducta sexual en estudiantes de dos instituciones de secundaria. El método empleado fue el cuantitativo, diseño descriptivo correlacional. La muestra estuvo constituida por 278 estudiantes, entre las edades de 13 a 19 años, se aplicó un cuestionario sobre conocimiento del VIH/SID y conducta sexual, validez=0.91 y confiabilidad 0.95. Los datos fueron analizados a través del paquete estadístico SPSS 15.0. Resultados: 61.9% pertenecen a la adolescencia temprana, 56% sexo masculino, En cuanto al conocimiento sobre VIH/SIDA los alumnos de un colegio parroquial presentaron mayor conocimiento adecuado, 48.2% frente a los del colegio nacional con 24.5%La prueba Chi cuadrado demostró que existe relación significativa entre sexo y conocimiento en colegio nacional; relación entre seco y conducta sexual en estudiantes del colegio parroquial

Palabras clave: Conocimiento VIH/SIDA - adolescencia.

Título: Masculinidad y violencia conyugal en estibadores de la Empresa Nacional de Puertos Iquitos- 2008

Autoras: Tangoa Morey, Gadi; Escobar Ramos, Nelly L.; Vásquez Vela, Zoila V.

Asesores: Silva Acosta, Zoraida y Zapata Vásquez, Eliseo

Código PS-33-2

Resumen

Para determinar la relación entre masculinidad y violencia conyugal en estibadores de la empresa nacional de puertos de Iquitos – 2008, se realizó este estudio descriptivo correlacional; la muestra estuvo constituida por 105 estibadores y sus parejas. En la recolección de datos se utilizó una entrevista estructurada (validez=0.96, confiabilidad=0.84), los datos se procesaron a través del paquete estadístico SPSS versión 15.0, se empleo la prueba estadística Phi, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 0.05. Los hallazgos principales señalan que el 63.8% de los sujetos de estudio mostraron masculinidad hegemónica, 91.4% rol protector, 84.8% ejercían violencia física, 93.3% violencia psicológica, 85.7% violencia sexual y 96.2% violencia económica. En el análisis bivariado no se encontró relación estadística significativa entre construcción de masculinidad, rol conyugal, equidad de género con la violencia física, psicológica y sexual ($p>0.05$).

Palabras clave: violencia de género.

Título: Factores biopsicosociales y culturales relacionados a prácticas de autocuidado en mujeres pre menopáusicas del AA. HH. Los Delfines, San Juan. 2008.

Autoras: Huansi Panduro, Lely K.; Montes García, Karin C.; Zavala Puente, Merly del Pilar

Asesores: Gutiérrez Chávez, Juana y Zapata Vásquez, Eliseo
Código MQ-42-2

Resumen

Con la finalidad de determinar la relación entre factores biopsicosociales y culturales y las prácticas de autocuidado en mujeres pre menopáusicas de un asentamiento humano del distrito de San Juan, se desarrolló un estudio transversal, descriptivo, correlacional. La muestra estuvo constituida por 100 mujeres entre 30 a 45 años. Se utilizó el Apgar familiar y una escala de autoestima (validez=0.91 y confiabilidad=0.97). Los datos se procesaron a través del paquete estadístico SPSS 15.0. Los resultados señalaron que el 57 % de las mujeres tienen de 30 a 38 años, 33 %, entre 39 a 45 años. El 89,0 % presenta autoestima alta, 79,0% con disfuncionalidad familiar. El 62 % son convivientes, 85 % trabajan dentro del hogar, 45 % tienen secundaria. Respecto a la variable dependiente, 85% reporta prácticas de autocuidado saludable (más del 65% de actividades correctas), el 52% de este grupo de mujeres tenían 30 a 38 años, y 79 tuvieron autoestima alta, 30.0% con disfuncionalidad familiar leve. Se concluye que factores biológicos y psicológicos estudiados tienen relación con las prácticas de autocuidado de las mujeres pre menopáusicas ($p < 0.05$)

Palabras clave: menopausia- autocuidado

Título: Características socio económicas, culturales y conocimiento sobre alimentación complementaria en madres de niños/as de 6 a 12 meses atendidos/as en el Centro de Salud de Moronacocha, Iquitos – 2008.

Autoras: Vizcarra Reyna, Alcea Vanesa

Asesores: Gutierrez Chávez, Juana y Zapata Vázquez, Eliseo
Código MI-83-2

Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre características socioeconómicas, culturales y el conocimiento sobre alimentación complementaria en madres de niños/as de 6 a 12 meses atendidos/as en un centro de salud de Iquitos. Diseño descriptivo correlacional, la muestra estuvo constituida por 180 madres determinada mediante la fórmula de proporciones a partir de 340 madres. Se aplicó un cuestionario para identificar las características socioeconómicas, culturales y conocimiento sobre alimentación complementaria. El 49.5% de madres se encuentran en edad adulta intermedia, 65% con secundaria, 90.6% en unión inestable, 56.1% proceden de zona rural, 73.9% con trabajo independiente; 65% manifestaron tener un ingreso económico mínimo, 81.7% tienen hábitos alimentarios inadecuados, 53.9% tienen creencias externas y el 64.4% con conocimiento adecuado sobre la alimentación complementaria. Las características que mostraron relación estadística significativa con el conocimiento sobre alimentación complementaria fueron la edad, grado de instrucción, estado civil, procedencia y ocupación ($p < 0.05$)

Palabras clave: alimentación- niños

Título: Variables asociadas a actitudes hacia el consumo de drogas en internos de los centros de rehabilitación de la ciudad de Iquitos - 2008

Autoras: Lemos Gil, Diana F.; López Arteaga, Margori M.

Asesores: Silva Acosta, Zoraida y Zapata Vázquez, Eliseo

Código PS-34-2

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las variables: edad, grado de instrucción, procedencia, nivel de conocimiento, ingreso económico familiar, rehabilitación, funcionalidad familiar, con las actitudes hacia el consumo de drogas en los internos de los Centros de rehabilitación de consumo de drogas de la ciudad de Iquitos – 2008. El método empleado fue el cuantitativo, diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional; la muestra estuvo constituida por 36 internos de los dos centros de rehabilitación de la ciudad de Iquitos. Los instrumentos utilizados fueron el Apgar Familiar, una Ficha de Rehabilitación, Escala de Actitudes y un Cuestionario (validez=0.87 y confiabilidad=0.71. En el procesamiento de datos se utilizó el programa SPSS. Los resultados destacan que fueron lo siguiente: el 88.9% son adultos, 80.6% con bajo nivel de instrucción, 52.8% ingreso económico familiar medio, 88.9% con disfuncionalidad familiar, 61.1% en condición de no rehabilitado. El 86.1% muestra actitud de rechazo hacia el consumo de drogas y el 13.9% actitud de aceptación. Existe asociación estadísticamente entre el nivel de conocimiento con las actitudes hacia el consumo de drogas ($\Phi = 4.12$; g.l. = 1; $\alpha = 0.05$, $p=0.014$)

Palabras clave: actitudes- drogas

Título: Efectos de una intervención educativa sobre embarazo en la adolescencia y el nivel de conocimiento, Varillal – San Juan 2008

Autoras: Chung Vásquez, Lady P.; Santillán Flores y Aquino Pipa, Paola M.

Asesores: Orbe Gaviola, Zulema y Avila Zavaleta, Wilson.

Código PS-31-2

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de una intervención educativa sobre embarazo en adolescentes de la comunidad. Se empleó un diseño cuasi experimental de tipo pre test y post test. La muestra estuvo constituida por 60 adolescentes de 13 a 19 años, 30 de ellos pasaron a formar parte del Grupo Experimental (GE) y 30 al Grupo Control (GC). La intervención educativa constó de 04 talleres con un total de 12 horas, se abordaron temáticas referidas a la sexualidad, embarazo, maternidad, paternidad y métodos anticonceptivos. Se aplicó ficha de captación y un cuestionario (validez=0.83 y confiabilidad de 0.83). Los resultados indicaron que ambos grupos compartían las siguientes características: el 23.3% del GE y el 20% del GC tenían entre a 10 a 13 años de edad. La prueba t de student señaló cambios significativos en el Grupo Experimental en el pre test y post test ($p=0.000$). Antes de la intervención la media de conocimientos fue similar para ambos grupos (23.8 en GE y 23.4 en GC. En el primer post test la media se incrementó a 39.2 en el GE, en el segundo a 36.6 y en el tercer post test a 36.8. ($p<0.05$).

Palabras clave: educación para la salud- adolescencia

Título: Factores sociales y maltrato en escolares del AA.HH. 9 de abril. Distrito San Juan - 2008

Autoras: Espinoza Carbajal, Ana Y.; Inga Mendoza, Graciela y Souza Álvarez Frida

Asesores: Silva Acosta, Zoraida y Zapata Vázquez, Eliseo
PS-30-2

Código

Resumen

El presente estudio se realizó con el objetivo de establecer la relación que existe entre los factores sociales y el maltrato en escolares en las familias de un AA.HH. del distrito de San Juan. Se empleó un diseño descriptivo correlacional. La muestra estuvo constituida por 118 escolares, seleccionados al azar, a quienes se aplicó el Apgar Familiar, Ficha de tamizaje, Cuestionario de Factores Sociales y una lista de Chequeo de Maltrato (validez=0.99 y confiabilidad= 0.91). Los datos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS versión 15.0. Los resultados mostraron que el 89.8% de escolares reportó maltrato moderado, 8.5% maltrato leve; el 94% de padres de familia informa unión estable, 84.7% de padres presenta algún grado de disfuncionalidad familiar y 85.5% antecedente de maltrato. Los factores sociales más importantes asociados al maltrato son sexo, funcionalidad familiar y antecedentes del maltrato de los padres ($p<0.05$).

Palabras clave: maltrato- disfuncionalidad familiar

Título: Factores biopsicosociales y culturales relacionados a la calidad de vida de personas viviendo con VIH/SIDA. Hospital Regional de Loreto. 2008

Autoras: Chávez Sajamí, Oriana J.; Del Castillo Vásquez, Sarita E. y Grandez Pezo, Milissa H.

Asesores: Gutierrez Chavez, Juana y Zapata Vázquez, Eliseo
PS-36-2

Código

Resumen

El presente estudio descriptivo correlacional tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los factores bio psicosociales, culturales y la calidad de vida de personas viviendo con VIH/SIDA. A 175 usuarios se aplicó el apgar familiar, escala de autoestima (validez 92.2%, confiabilidad 78%) y escala de calidad de vida (validez 93.5% y confiabilidad 93%). Los datos fueron analizados utilizando el programa estadístico SPSS. El 61.3% son del sexo masculino, 54.2% adultos jóvenes, 43% con estudios secundarios, 61.3% trabajan. El 62% presentaron carga viral baja. El 66.2% mostraron autoestima alta, 39.4% disfunción familiar leve. Los sujetos de estudio presentaron puntuaciones altas de calidad de vida alta en evaluación de síntomas 84%, situación emocional 80%, aspectos socio laborales 57.1%, acontecimientos vitales 85.7%, valoración global de la salud 75.4%. Mientras que, refieren calidad de vida baja en el factor biológico: el 54.5% de varones, 69.7% adultos jóvenes y 78.8% con carga viral baja.

Palabras clave: VIH/SIDA- calidad de vida

Título: “Conocimiento y actitud sobre métodos anticonceptivos en estudiantes de la Facultad de Enfermería Iquitos-Perú. 2007

Autoras: Hidalgo Diaz Ketty L. y Pinedo Cancino Johana V.

Asesores: Vilchez Ramirez Ruth y Zapata Vázquez, Eliseo
Código MI-86-2

Resumen

El presente estudio tuvo como finalidad determinar la relación entre el conocimiento y actitud sobre métodos anticonceptivos en estudiantes de la facultad de enfermería. El método que se empleo fue el cuantitativo, diseño descriptivo transversal/correlacional. Se determino un tamaño muestral de 181 estudiantes, para la obtención de los datos se aplicó un cuestionario que constó de 15 ítems, los resultados obtenidos se analizaron a través de la estadística descriptiva con la interpretación de frecuencias y porcentajes en las tablas y de la estadística inferencial mediante la prueba estadística Chi – cuadrada con factor de corrección por continuidad, nivel de confianza de 95%, error $\alpha = 0.05$, con $p < 0.05$ para aceptar la significancia. Las mayores frecuencias 58,6% se obtuvieron en conocimiento inadecuado y 85,6% con actitud adecuada sobre métodos anticonceptivos. Así mismo el mayor porcentaje 88,5% fue para los estudiantes que presentaron actitud adecuada pero conocimiento inadecuado sobre métodos anticonceptivos y el menor porcentaje 11,5% fue para los estudiantes con actitud inadecuada pero conocimiento adecuado sobre métodos anticonceptivos. Se determinó relación entre el conocimiento y la actitud sobre métodos anticonceptivos $X^2 = 9,79$, $p < 0.002$.

Palabras clave: estudiantes, métodos anticonceptivos

Título: “Conocimiento sobre VIH/Sida y comportamiento sexual en homosexuales atendidos en el centro de salud San Juan - 2007”

Autores: Henry Lellis Ava Oliveira; Melina Salva Pereyra y Torres Macedo Allan

Asesores: Sevillano Bartra Zulema

Código SX-19-S

Resumen

El objetivo del presente estudio fue determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA con el comportamiento sexual en homosexuales atendidos en el Centro de Salud San Juan de la ciudad de Iquitos ; se empleó un diseño descriptivo correlacional. La muestra estuvo constituida por 92 homosexuales cuyas edades fluctuaban entre 15 a 45 años de edad, que acudían a consulta al Centro de referencia de infecciones de transmisión sexual y SIDA. Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario (validez de 90.76% y confiabilidad 89.76). Los datos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS 12.0. Los resultados mostraron que el 65.2% de sujetos presentaron conocimiento inadecuado, sobre el VIH/SIDA. El 59.8% presentaron comportamiento sexual de alto riesgo, mientras que 40.2% de bajo riesgo. Al asociar el conocimiento sobre VIH/SIDA con la variable comportamiento sexual, se encontró asociación estadística significativa ($X^2_c = 16.4$), por lo cual se aceptó la hipótesis de estudio.

Palabras Clave: Conocimiento- VIH/SIDA.

Título: “Conocimiento y actitudes asociados al uso del condón en estudiantes de instituciones educativas secundarias estatales de Iquitos - 2007”

Autoras: Arista Rodríguez Zéfora B.; Huamán Ríos Liz E. y Torres Andrade María del Pilar

Asesores: Sevillano Bartra Zulema

Código SX-18-2

Resumen

Este estudio pretendió determinar si existe asociación entre el conocimiento y las actitudes hacia el uso del condón en estudiantes de 5° de secundaria del turno diurno de instituciones educativas estatales de la ciudad de Iquitos durante el año 2007. Se empleó el diseño no experimental correlacional. La muestra estuvo constituida por 226 estudiantes. Se usó un cuestionario sobre conocimiento del condón (validez 83.8% y confiabilidad 82.7%, una escala de actitudes (validez 89.8%, confiabilidad 88.6%) y una guía sobre el uso del condón (validez 89.3%, confiabilidad 87.9%). Los datos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS versión 12. Se encontró que el 76.5% de estudiantes tuvieron conocimiento no adecuado del condón, 56.6% tuvieron actitudes de rechazo y 63.3% tuvieron uso incorrecto del condón. Al relacionar las variables en estudio se encontró que existe relación estadísticamente significativa entre el conocimiento sobre el uso del condón y las actitudes hacia el uso del condón.

Palabras clave: anticonceptivos- estudiantes

Título: “Variables tiempo y lugar asociados a la prevalencia de malaria en la Región Loreto periodo 2001 al 2006. Iquitos - 2007”

Autoras: Barnett Pinedo Vanessa; Perez Peterman Luzdina y Romero Torres Aswel

Asesores: Vasquez Da Silva Perla y Vasquez Matute Armando
Código COM-12-1

Resumen

Se realizó el presente estudio retrospectivo descriptivo correlacional, con el objetivo de determinar la correlación entre las variables de tiempo y lugar con la prevalencia de la malaria. La población estuvo conformada por los casos de malarías notificados a nivel regional. Los resultados obtenidos indican que existe una correlación inversa negativa entre Malaria vivax según lugar (microrredes), la prueba r de Pearson = -0.378, como se puede apreciar es una correlación inversa negativa y significativa con una significancia de 0.001. De la misma manera existe una correlación inversa negativa entre Malaria falciparum según lugar, $r = 0.079$, pero no es significativa ya que tiene una significancia de 0.508; esto nos indica que la Malaria falciparum no se encuentra asociada a los lugares reportados (microrredes). Así mismo la temperatura, la humedad y la precipitación pluvial son variables que no están correlacionadas con la presencia de la malaria vivax con un $r = 0.266$ y falciparum con un $r = 0.246$, por los bajos coeficientes de correlación que así lo indican; sin embargo la prueba t indica que la temperatura es una variable con una significancia = 0.040 que se encuentra directamente relacionada con la presencia de la malaria vivax

Palabras claves: malaria.

Título: “Factores modificables relacionados a la capacidad funcional del adulto mayor asilado en el albergue San Francisco de Asís Iquitos – 2007”

Autoras: Alvan Aguilar Katty G.; Márquez Del Águila Breña y Sánchez Valera Linda M.

Asesores: Flores Torres Elba y Zapata Vázquez, Eliseo
Código GRT-9-1

Resumen

El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación que existe entre los Factores Modificables: Alimentación, Peso, Sueño y Depresión con la capacidad funcional del Adulto Mayor asilados en el Albergue San Francisco de Asís. Se trata de un estudio descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada, por 46 adultos mayores asilados en el Albergue seleccionados por conveniencia. Para la recolección de los datos se utilizaron los siguientes instrumentos Tabla de Observación de Consumo de Alimentos y para la evaluación del peso se empleó el Índice de Masa Corporal, además se usó un cuestionario sobre la Alteración del Sueño elaborado por Antonio Lobo y Pedro E Muñoz, Escala de Depresión de Yesavage, Índice de Barthel. Los datos obtenidos se analizaron con el estadígrafo en tablas de contingencia con la prueba de asociación Chi cuadrada (X^2) con un nivel de confiabilidad de 95%. Los hallazgos mostraron que las variables Alimentación, Sueño y Depresión tienen relación estadísticamente significativa con la Capacidad Funcional. La variable Peso no tiene relación estadísticamente significativa con la Capacidad Funcional.

Palabras clave: capacidad funcional- envejecimiento

Título: “Variables socio demográficas y culturales y Autocuidado en Leptospirosis en pobladores del programa de vivienda para damnificados “Los Delfines”, Iquitos – 2007”

Autoras: Bardalez Ángulo Patricia; Rengifo Ruiz Liz y Sipán Mendoza Silvia Eliana

Asesores: Gutierrez Chavez Juana y Zapata Vázquez, Eliseo

Código COM-11-4

Resumen

Con el objetivo de determinar la relación que existe entre las variables sociodemográficas y culturales: Edad, sexo, ingreso económico familiar, grado de instrucción, ocupación, procedencia, tipo de vivienda, nivel de conocimiento y las prácticas de autocuidado en Leptospirosis en el Programa de Vivienda para Damnificados “Los Delfines” de la ciudad de Iquitos, durante el año 2007. Se trata de un estudio descriptivo correlacional. La muestra constituida por 293 personas de 15 a más años de edad, ambos sexos y procedencia urbana, periurbana y rural. Las técnicas empleadas fueron: Entrevista y observación. Se aplicó un cuestionario (validez 80%, confiabilidad 79%) y Lista de verificación (validez 89% y confiabilidad 95%). La prueba estadística empleada fue el Chi – cuadrado. Entre los hallazgos más relevantes tenemos: el 73.0% de pobladores practican medidas de autocuidado con menor frecuencia. Se encontró asociación significativa entre las prácticas de autocuidado en Leptospirosis entre las variables: Ingreso económico familiar y el nivel de conocimiento ambos con un valor $p=0.000$; no se encontró asociación significativa con las variables: Edad, sexo, grado de instrucción, ocupación, procedencia y tipo de vivienda.

Palabras clave: Leptospirosis- Autocuidado-

Título: “Factores socio demográficos y psicológicos relacionados al intento de suicidio en pacientes atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud. Iquitos- 2007”

Autores: Villaverde Montoya, Sheyla J.; Flores Flores, Dennys D. y Flores Curichimba, Llermé.

Asesores: Orbe Gaviola Zulema y Zapata Vázquez, Eliseo

Código PS-29-2

Resumen

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la relación que existe entre los factores sociodemográficos y psicológicos con el intento de suicidio en pacientes atendidos en los establecimientos de salud. Se empleo el método cuantitativo, diseño descriptivo correlacional. La muestra estuvo constituida por 129 pacientes con diagnostico de Intento de Suicidio. Se utilizó el muestreo Probabilístico estratificado. Para la recolección de los datos se utilizo cuatro instrumentos estandarizados: Test de Autoestima, Escala de Autoevaluación de la Depresión, Escala de valoración del Apgar Familiar y un Cuestionario sobre factores sociodemográficos (validez 83.3%). Los datos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS versión 13.0. El 63.3% de sujetos que intentaron suicidarse fueron adultos, 59.7% de sexo femenino, 55.8% no tuvieron pareja, 65.1% no tuvieron empleo, 55.8% presentaron depresión leve, 93.8% autoestima baja, 57.4% disfuncionalidad severa. El 62.8% intentaron suicidarse con órganos fosforados. Las variables relacionadas al intento de suicidio fueron sexo ($p= 0.015$), edad ($p= 0.026$), grado de instrucción ($p= 0.033$), autoestima ($p= 0.001$), funcionalidad familiar ($p = 0.010$).

Palabras clave: Intento de suicidio-autoestima

Título: “Cuidados de enfermería y las infecciones nosocomiales en los servicios: Uci-cirugía y Cirugía Hospital Felipe Arriola Iglesias Iquitos 2007”

Autoras: García Cadillo, Teresa de J.; Kahn Cacique, Gisel y Yglesias Salguero, Rosa M.

Asesores: Castillo Grandez Inés y Zapata Vázquez, Eliseo
Código MQ-41-2

Resumen

Con el objetivo de establecer la relación entre los cuidados que brinda el profesional de enfermería y las infecciones nosocomiales en los servicios de UCI-Cirugía y Cirugía, se llevó a cabo un estudio descriptivo correlacional. La muestra estuvo constituida por 51 usuarios hospitalizados en los servicios de UCI-Cirugía y Cirugía del Hospital Felipe Arriola Iglesias de la ciudad de Iquitos durante 30 días. Se aplicó una ficha de observación al profesional de enfermería (validez 86.4% y confiabilidad 81%), y una ficha de observación al usuario hospitalizado (validez 95.3% y confiabilidad 81.3 %). Los datos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS versión 15.0, EXCEL 2007, Windows 2007; para el análisis descriptivo bivariado se utilizó el test de Fisher por ser tablas de contingencia de 2x2 y valores 0 donde se obtuvo un 95% de nivel de confianza y $\alpha = 0.05$. 32 usuarios presentaron flebitis en la inserción de catéter venoso periférico. De 06 usuarios con inserción de catéter urinario, 05 presentaron I.T.U. existe relación estadísticamente significativa entre los cuidados de enfermería y las infecciones nosocomiales.

Palabras claves: Enfermería, infecciones nosocomiales

Título: Nivel de conocimiento y prácticas de bioseguridad en estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos – 2007

Autoras: García Macedo, Norma; Solignac Mavila, Sheyli Y Vásquez Torres Andía A.

Asesores: Gutierrez Chavez, Juana y Zapata Vázquez, Eliseo
Código

Resumen

Se realizó un estudio descriptivo y transversal con el objetivo de determinar la relación que existe entre el Nivel de Conocimiento y las Prácticas de Normas de Bioseguridad en los Estudiantes de Enfermería. A 106 estudiantes de enfermería determinados por afijación proporcional se aplicó un cuestionario (validez 79% y confiabilidad 78%), y una lista de cotejo (validez 82% y confiabilidad 91%). Los datos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS versión 13.0; se utilizó la prueba estadística no paramétrica del Coeficiente de Correlación Tetracórica (r_t), con un nivel de significancia de $\alpha=0.05$. Entre los hallazgos más importantes sobre nivel de conocimiento tenemos: el 76.4% de estudiantes tuvieron conocimiento adecuado y respecto a las prácticas de normas de bioseguridad, el 65.1% de estudiantes realizaron prácticas inadecuadas. Al relacionar el nivel de conocimiento con prácticas de bioseguridad se encontró que existe relación estadística significativa ($p<0.05$)

Palabras claves: Bioseguridad- Conocimiento

Título: “Factores ginecoobstétricos y Neoplasia Intraepitelial Cervical en mujeres atendidas en el servicio de Ginecología del Hospital Regional Iquitos – 2007”.

Autores: De La Cruz Rodríguez, Leslie S.; Laulate Sangama, Fernando Y Paino Cadillo, Karla

Asesores: Silva Acosta, Zoraida y Zapata Vázquez, Eliseo

Código MI-80-2

Resumen

Esta investigación descriptiva retrospectiva determinó la relación que existe entre los Factores Ginecoobstétricos y Neoplasia Intraepitelial Cervical en mujeres atendidas en el servicio de Ginecología del Hospital Regional de Loreto. Se revisó 130 historias clínicas de mujeres atendidas en el servicio de ginecología con diagnóstico de Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC) grados I, II, III y cáncer in situ. Se usó una Ficha de cotejo (validez 100% y confiabilidad 92%). El 72.3% fueron mujeres que iniciaron sus relaciones sexuales a edad temprana, 17.4 ± 1.6 años; 61.5% reportaron pareja única, 2.2 ± 1.5 parejas; 80.8% reportaron que su compañero sexual tuvo varias parejas, 3.0 ± 1.5 parejas; el 47.7% eran mujeres multíparas y gran multíparas, 2.4 ± 2.1 hijos; 36.2 % presentaron algún aborto. El 58.5% de mujeres presentaron neoplasia intraepitelial cervical de bajo grado (NIC I). En el análisis bivariado se comprobó que existe relación estadísticamente significativa entre las variables: edad de inicio de las relaciones sexuales ($p= 0.001$), número de parejas sexuales ($p= 0.002$), antecedente sexual de la pareja ($p= 0.008$), paridad ($p= 0.004$) y aborto ($p= 0.000$).

Palabras clave: Neoplasia intraepitelial cervical.

Título: “Condiciones del cuidador informal relacionado al grado de dependencia del adulto mayor atendido en Padomi del Hospital III - EsSalud Iquitos - 2007”

Autores: Paima Flores, Paúl M.; López Pasquel, Jorge G. y Caycho Herbozo, Zenaida.

Asesores: Flores Torres Elba y Zapata Vásquez, Eliseo
Código

Resumen

La presente investigación, tuvo como finalidad determinar la relación que existe entre el grado de dependencia del adulto mayor y las condiciones del cuidador informal atendidos en el Programa de Atención Domiciliaria del Adulto Mayor. El método empleado fue Cuantitativo, diseño descriptivo transversal. La muestra estuvo constituida por 198 adultos mayores y cuidadores Informales de dicha institución: la selección de la muestra fue por el método aleatorio simple. Los instrumentos utilizados fueron: Índice de Barthel (validez 97% y confiabilidad de 92%), Cuestionario de Sobrecarga del Cuidador Informal de Zarit (confiabilidad 81%), Cuestionario de Calidad de Vida (confiabilidad 97% validez 74%) y Valoración Socio-Familiar (confiabilidad 87%, validez 89%). Las hipótesis fueron verificadas mediante la prueba estadística no paramétrica Chi cuadrada (X^2), asumiendo un nivel de 0.5 de confianza. Existe relación entre el Grado de Dependencia del Adulto Mayor y las Condiciones del Cuidador Informales (Sobrecarga, Calidad de Vida y Repercusiones Socio familiares).

Palabras Clave: Dependencia, Cuidador familiar.

Título: “Factores socio demográficos y psicológicos relacionados a la violencia física de la mujer del departamento de familia – PNP, Iquitos - 2007”

Autoras: Falcón Fajardo, Goldie E.; Ruiz Lozano, Cinthia G.; Taminche Shapiama, Tania.

Asesores: Orbe Gaviola Zulema y Avila Zavaleta Wilson

Código PS-28-2

Resumen

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar si existe relación entre los factores sociodemográficos y psicológicos: Edad, Grado e instrucción, Estado civil, Condición laboral, Nivel de autoestima, Funcionalidad familiar y la violencia física de la mujer del Departamento de Familia – PNP, Iquitos, 2007. El método empleado fue el cuantitativo, se empleó el diseño NO experimental de tipo correlacional. La población del presente estudio estuvo conformada por 256 mujeres víctimas de violencia atendidas en el Departamento de Familia de la Policía Nacional del Perú, y la muestra lo constituyeron 78 mujeres que cumplieron con los criterios. El 50% de la muestra fueron menores de 18 años de edad, 87.2% tienen grado de instrucción bajo, 87.2% convivientes, solo 35.9% percibe remuneración económica. El 94% mostró autoestima baja, 41% disfunción familiar moderada. El 71.8% reportaron violencia física leve y 28.2% violencia física severa, siendo más frecuente en las mujeres con grado de instrucción bajo. Se comprobó que existe una relación directa entre el Grado de Instrucción y la violencia física de la mujer atendida en el Departamento de Familia – PNP.

Palabras clave: Violencia de género

Título: “Efecto de un programa educativo sobre saneamiento básico del agua y prácticas sanitarias en pobladores del AA HH “31 de mayo” Iquitos – 2007”

Autores: Ampudia Navarro, Jonás; Cacique Salas, Teresita de J. y Gómez Ramírez, Ana I.

Asesores: Torres Silva Rossana y Avila Zavaleta Wilson

Código COM-10-2

Resumen

El objetivo fue determinar el efecto del programa educativo sobre Saneamiento Básico del agua, en el grado de conocimiento y prácticas sanitarias en pobladores del AH “31 de Mayo”. Se trató de un estudio cuasi experimental en series de tiempo. El programa educativo tuvo como finalidad que la familia y la comunidad adquieran y refuercen conocimientos, actitudes y practicas favorables para consumo de agua segura, tuvo una duración de tres sesiones (01 hora/sesión), con visitas domiciliarias post evaluación al 7°, 15° y 30° día. A 30 sujetos, se aplicó talleres, demostraciones y observaciones. Instrumentos: Cuestionario (validez 77%) y (confiabilidad 87%) la Lista de Verificación (validez 87%). Los datos fueron procesados utilizando el programa estadístico fue el SPSS versión 15.00, aplicándose la prueba inferencial paramétrica t student. Antes de la aplicación del programa educativo se aplicó el pre test, observándose un predominio de conocimiento inadecuado con 93.3%; y prácticas inadecuadas con 83.3%, después de la aplicación del programa se observó cambios significativos, en conocimiento $p= 0,00$ en el post test inmediato y del mismo modo a los 15 días, manteniéndose los mismos niveles significativos a los 30 días y con respecto a las prácticas $p= 0. 00$ se observó cambios a los 30 días.

Palabras claves: educación, saneamiento.

Título: “Variables socio demográficas asociadas a los conocimientos y actitudes sobre VIH/ Sida en docentes de la institución educativa Mariscal Oscar R. Benavides. Iquitos - 2007”

Autoras: Chávez Ríos, Rosa I.; Valera Pereira, Lissy N. y Vargas Pinedo, Nayla L.

Asesores: Sevillano Bartra Zulema

Código PS-27-1

Resumen

Por la importancia que recobra la pandemia del VIH/SIDA, surgió el interés de determinar la asociación que existe entre las variables sociodemográficas: edad, sexo, estado civil, religión, asignatura que enseña y tiempo de servicio con los conocimientos y actitudes sobre el VIH / SIDA en docentes de educación secundaria. Se utilizó un diseño descriptivo correlacional. La muestra estuvo constituida por 164 docentes cuyas edades fluctuaban entre 25 a 65 años de edad, de ambos sexos. Se aplicaron dos instrumentos, un cuestionario para medir conocimientos (validez 80% y confiabilidad 84%) y una escala de actitudes y para la escala de actitudes (validez 87% y confiabilidad 88.5%). Estos datos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS 12.0. El 61% de docentes presentaron conocimiento adecuado, el 79% presentaron actitud de aceptación. Al asociar los conocimientos sobre VIH/SIDA con la variables sociodemográficas. Las variables que mostraron relación estadística significativa con el conocimiento fueron edad, sexo, religión, asignatura que enseña y tiempo de servicio. Así mismo las variables que se relacionan con la actitudes hacia el VIH/SIDA son edad, sexo, religión, asignatura que enseña y tiempo de servicio ($p < 0.05$).

Palabras clave: conocimiento- actitudes- VIH/Sida

Título: “Autoestima, funcionalidad familiar y cumplimiento del tratamiento en la estrategia sanitaria de prevención y control de tuberculosis en los hospitales del Ministerio de salud Iquitos 2007”

Autoras: Alvarado Cora, Jossy D.; Bardales Ruiz, Doris D. y Rios Salinas, Jacqueline Del P.

Asesores: Alvarado Cora Haydeé y Zapata Vázquez, Eliseo

Código MQ-39-2

Resumen

El Objetivo es determinar la asociación entre autoestima, funcionalidad familiar con el tratamiento en el Programa de Tuberculosis de Hospitales del Ministerio de salud Iquitos. El método empleado fue el cuantitativo con el diseño descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 80 personas con diagnóstico de TBC, frotis positivo, de los Hospitales: Regional y Apoyo Iquitos. Los instrumentos utilizados fueron: Escala de Valoración de autoestima, (confiabilidad 71%), APGAR familiar (validez 85%, confiabilidad 82%) y Ficha de análisis de Contenido Sobre el Cumplimiento del Tratamiento Antituberculoso. El 77.5% de pacientes de ambos Hospitales cumplen con el tratamiento antituberculoso, el 66.3% presentaron autoestima baja, y el 56.3% presentaron disfuncionalidad familiar leve. Los hallazgos mostraron asociación estadística significativa entre autoestima y Funcionalidad Familiar con cumplimiento del tratamiento antituberculoso ($p < 0.05$)

Palabras clave: Cumplimiento del Tratamiento- Tuberculosis

Título: “Nivel de conocimiento y actitudes hacia la violencia conyugal en mujeres del distrito de Belén - Maynas 2007”

Autores: Monteza Rojas, Nancy J.; González Dávila, Lincol y Rafael Flores, Noemí.

Asesores: Vilchez Ramirez Ruth y Avila Zavaleta Wilson
Código PS-26-2

Resumen

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes hacia la violencia conyugal en mujeres de 15 a 49 años en el área urbano- marginal del distrito de Belén – Maynas 2007. Se utilizó el método cuantitativo y el diseño fue de tipo no experimental, de carácter descriptivo, transversal/correlacional. La muestra estuvo constituida por 384 mujeres del Distrito de Belén – Maynas, 2007, la cual fue seleccionada aleatoriamente. Para la recolección de datos, se utilizó 2 instrumentos: un cuestionario y una escala de actitudes tipo likert que fueron validados mediante juicio de expertos, obteniéndose una validez de 100% para el cuestionario y para la escala de actitudes 98%; la confiabilidad obtenida en el cuestionario fue de 75% y para la escala de actitudes 84%. Los datos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS versión 13, se empleó la prueba estadística no paramétrica Chi cuadrado con un nivel de confianza del 95% y un margen de error $\alpha = 0.05$. Entre los resultados obtenidos se encontró relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y las actitudes hacia la violencia conyugal con $X^2_c = 54.319$, $p = 0.000$.

Palabras clave: violencia de género.

Título: “Efectos de una intervención educativa: nivel de conocimiento y actitud de pacientes frente al tratamiento antimalarico del centro de salud San Juan, Iquitos - 2006”

Autoras: García Flores, Nelly; Paredes Monteluis, Elizabeth y Villacrés Taminche, Kethy.

Asesores: Reyna Del Aguila Elsa y Jara Ibarra Juan de Dios

Código MQ-40-2

Resumen

Con el fin de determinar el efecto de la intervención educativa en el nivel de conocimiento y actitud frente al tratamiento antimalarico en pacientes atendidos en un centro de Salud se aplicó un estudio cuasi – experimental, tipo de Pre y Post prueba. La muestra estuvo constituida por 30 pacientes de 15 – 45 años de edad: Grupo Experimental (15 pacientes) y Grupo Control (15 pacientes). Se aplicó un cuestionario de Conocimiento y una escala tipo Likert. Antes de la intervención educativa, el 73.3% de pacientes del grupo experimental presentaron conocimiento inadecuado al igual que los pacientes del grupo control. El 80% de pacientes del grupo experimental evidenciaron actitud negativa al igual que los pacientes del grupo control. Después de la intervención educativa, 93.3 % de pacientes del grupo experimental presentaron conocimiento adecuado y 6.7 % conocimiento inadecuado, a diferencia de los pacientes del grupo control mantuvo los mismos resultados. 86.7% de pacientes del grupo experimental evidenciaron actitud positiva y 13.3 % actitud negativa; mientras que el 13.3% de pacientes del Grupo Control evidenciaron actitud positiva y 86.7% actitud negativa. El Análisis de Varianza mostró diferencias estadísticas significativas ($p=0.000$) para el nivel de conocimiento y actitud en el grupo experimental.

Palabras clave: malaria- conocimientos- actitud.

Título: “Características familiares asociadas al desarrollo psicomotriz del niño de 3 a 5 años del Distrito de Belén – Zona Baja, 2006”

Autoras: Arévalo Moreno, Liz V.; Quiroz Murrieta, Francesca V. y Tuesta Bardales, Amaryllis.

Asesores: Flores Tores Elba y Zapata Vázquez, Eliseo

Código MI-77-1

Resumen

Este estudio descriptivo transversal pretendió determinar la asociación que existe entre las características familiares y el desarrollo psicomotriz en niños de 3 a 5 años en las Instituciones Educativas Iniciales del distrito de Belén. La muestra lo constituyeron 228 niños. Los instrumentos utilizados fueron: Test de percepción del funcionamiento familiar (validez 94%, confiabilidad 88%), cuestionario de características familiares (validez 83%, confiabilidad 70%) y el Test de desarrollo psicomotriz. Los resultados indicaron que el 36.0% de niños tuvieron desarrollo normal, 37.3% en riesgo y 26.8% retraso en su desarrollo. El 80.7% de familias eran disfuncionales, 47.8% de familia extensa y 78.9% con estructura familiar adecuada. El 30.7% y 18.8% de niños se encontró en riesgo y retraso respectivamente y son de familias disfuncionales, 18% niños se encuentran en riesgo en su desarrollo y pertenecieron a una familia extensa, 29.4% se encuentran en riesgo en su desarrollo y tiene una estructura adecuada. Al asociar las variables de estudio se encontró que existe asociación estadísticamente significativa entre la funcionalidad familiar y el desarrollo psicomotriz en niños de 3 a 5 años.

Palabras clave: desarrollo sicomotriz

Título: “Calidad de atención y nivel de satisfacción de usuarios externos de los servicios materno infantil, Hospital Regional de Loreto, Iquitos, 2006”.

Autores: Hidalgo Vásquez, Clara R.; Meza Ampuero, José H. y Sánchez Ramírez, Dámaris

Asesores: Flores Torres Elba y Zapata Vázquez, Eliseo
Código MI-76-2

Resumen

Con el objetivo de determinar la relación entre la calidad de atención y el nivel de satisfacción de usuarios externos de los servicios Materno Infantil del Hospital Regional de Loreto, Iquitos, 2006. Se desarrolló este estudio descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 218 usuarios determinada mediante muestreo probabilístico aleatorio estratificado. Los instrumentos utilizados fueron: Cuestionario de Calidad de Atención, que exploró características sociales, características patológicas y cuestionario de Calidad de atención, con 32 ítems (validez 94% y confiabilidad 60%). También se utilizó la Escala de Satisfacción de Usuarios (validez 86% y confiabilidad 79%). Los datos se analizaron en el SPSS versión 13.0. El 61.5% de usuarios afirmaron que la calidad de atención fue regular, el 92.2%, se mostraron satisfechos. La prueba estadística no paramétrica Chi – cuadrada donde que determinó que existe asociación estadísticamente significativa entre dichas variables ($X^2_c=10.516$, $\alpha = 0.05$ y $p = 0.001$).

Palabras clave: Calidad de la atención- salud.

Título: “Factores maternos relacionados a Hipertensión inducida por el embarazo en pacientes atendidas en el Hospital Regional de Loreto. 2000-2005”

Autoras: Meza Lozada, Silvia R.; Reátegui Baca, Laura E. y Reátegui Castillo, Angélica J.

Asesores: Silva Acosta, Zoraida

Código MI-78-2

Resumen

El objetivo de la investigación fue de establecer relación entre los factores maternos y la Hipertensión inducida por el embarazo en gestantes atendidas en el Hospital Regional de Loreto 2000-2005. Se empleó un diseño descriptivo retrospectivo, en una muestra de 155 gestantes. Se utilizó una ficha de recolección de datos de las historias clínicas (validez 87%). Los datos se analizaron a través de los paquetes estadísticos SPSS versión 13. Los hallazgos muestran que el 41.9% presentaron edad extrema y 58.1% óptima, 49.7% primíparas, 20.6% con antecedente familiar, 10.3% presentan bajo peso, 49% presentaron más de 4 controles, 16.1% presentan espacio intergenésico corto, 5.8% consumió tabaco. El 25.8% presentaron preeclampsia leve y 54.8% preeclampsia severa, 18.7% presentaron eclampsia, 0.6% síndrome de hellep. Se encontró relación estadísticamente significativa entre las variables: Edad vs. Hipertensión inducida por el embarazo en gestantes $\chi^2 = 15.4$ gl=3 $p=0.02$, paridad vs. Hipertensión inducida por el embarazo $\chi^2 = 8.29$ gl=3 $p=0.04$, Historia Familiar vs. Hipertensión inducida por el embarazo e $\chi^2 = 10.10$ gl = 3 $p=0.02$.

Palabras clave: Hipertensión- embarazo.

Título: “Factores biológicos –ambientales y Autocuidado en adultos hipertensos del Hospital III EsSalud, Iquitos - 2006”

Autoras: Avendaño Vásquez, María O.; Panaifo Pinedo Paquita de J. y Yataco Torres, Blanca del C.

Asesores: Lazaro Rubio Elena y Jara Ibarra Juan de Dios

Código GRT-8-1

Resumen

Para determinar la relación entre Factores Biológicos Ambientales y el Autocuidado de Adultos Hipertensos del Hospital III EsSalud -Iquitos- 2006; se llevó a cabo un estudio descriptivo. La muestra estuvo constituida por 228 adultos hipertensos. Se aplicó un cuestionario (validez 99%), Inventario de Estrés (validez 99%, confiabilidad 71%); Test de Autocuidado (validez 99.9 %, confiabilidad 85%). Las hipótesis fueron verificadas mediante la prueba estadística no paramétrica Chi cuadrada (X^2), con el soporte del programa estadístico SPSS versión 13.0 asumiendo un nivel del 95% de confianza. Según los hallazgos, existe relación estadísticamente significativa entre Factores Ambientales y Autocuidado: estrés y autocuidado (p):0.003 < 0.05; alimentación y autocuidado (p):0.000 < 0.05; I.M.C y autocuidado (p): 0.000 < 0.05; hábitos nocivos y autocuidado (p):0.000 < 0.05; actividad física y autocuidado (p):0.000 < 0.05.

Palabras clave: Autocuidado- hipertensión arterial.

Título: “Factores socio demográficos, culturales y parasitosis intestinal en niños de la institución educativa inicial n° 342 Micaela Bastidas, Iquitos, 2006”.

Autoras: Barria Ramírez, Jhoanna F.; Pereyra Espinoza, Lotty M. y Torres López, Corita L.

Asesores: Bardales Arévalo Rosario y Jara Ibarra Juan de Dios
Código MI-75-2

Resumen

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la relación entre los factores sociodemográficos, culturales y parasitosis intestinal en niños de la Institución Educativa Inicial N° 342 Micaela Bastidas, durante el año 2006, el método empleado fue el cuantitativo y el diseño fue descriptivo correlacional/ transversal. La muestra estuvo conformada por 135 niños con sus respectivas madres. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario (validez 81%) y un test de conocimiento (confiabilidad 87%). Los datos se procesaron a través del paquete SPSS versión 13.0. El 58,5% tienen madres con nivel económico muy bajo, 69,6% no tienen hacinamiento dentro de sus hogares, 91,9% se abastecen de agua potable dentro de sus hogares, 64,4% consumen agua no tratada, 53,3% almacenaban sus basuras dentro de sus hogares, 58,5% eliminan sus excretas a través del arrastre hidráulico, 63,7% viven en viviendas rústicas, 90,4% de las madres son amas de casa, 45,9% tienen nivel de instrucción secundario, 60,7% tienen nivel de conocimiento medio. El 62,2% de niños presentan parasitosis intestinal. Se encontró que no existe relación estadísticamente significativa entre las variables estudiadas y la parasitosis intestinal ($p>0.05$).

Palabras clave: Parasitosis intestinal- niños.

Título: “Factores de riesgo cardiovascular asociados a enfermedad coronaria en pacientes del consultorio de medicina del Hospital Iquitos III EsSalud 2006”

Autoras: Flores Bardales, Lucía Del C.; Nájjar Villacorta, Isabel y Vallejos Reátegui, Shirley M.

Asesores: Reyna Del Aguila, Pisconte Pachas Cesar y Jara Ibarra Juan de Dios

Código MQ-38-2

Resumen

Esta investigación tuvo objetivo determinar el grado de asociación entre los Factores de Riesgo Cardiovascular y los Niveles de Enfermedad Coronaria en Pacientes Adultos del Consultorio de Medicina Hospital Iquitos III-Es-Salud. Se utilizó el diseño descriptivo Transversal, la muestra estuvo constituida por 140 adultos. Se aplicó un cuestionario de Factores de Riesgo Cardiovascular (validez 80.7%), Escala PDS, Test de Riesgo y una lista de Cotejo (confiabilidad 85%). Los datos se analizaron a través del Paquete Estadístico SPSS versión 13. El 69.3% no tienen habito de fumar, 59.3% presentan hipertensión arterial, 95% presentan glicemia normal, 59.3% presentan colesterol normal, 51.4% presentan triglicéridos normal, 45% presentan obesidad, 51.4% no realizan ejercicios, 57.1% presentan estrés, 59.3% son sexo femenino, 47.9% son adultos intermedios, 69.3% no presentan predisposición familiar ,40% son empleados y 45% presentan educación superiores. Las variables que mostraron relación estadísticamente significativa fueron: niveles de triglicéridos ($p= 0.018$), predisposición familiar ($p= 0.000$).
Palabras clave: enfermedad coronaria- adultos

Título: “Conocimientos y actitudes sobre explotación sexual infantil asociadas a variables socio demográficas en estudiantes de una institución educativa secundaria Iquitos – 2006”

Autoras: Hernández Rodríguez, Anita; Paucar Lemos, Dennyse y Pérez Ortiz, Jessica J.

Asesores: Sevillano Bartra Zulema

Código PS-23-1

Resumen

El objetivo fue determinar la asociación entre los conocimientos y actitudes sobre la explotación sexual infantil con las variables socio demográficas en estudiantes del 1° al 5° grado de secundaria. El diseño metodológico fue el descriptivo correlacional. La muestra estuvo constituida por 321 estudiantes adolescentes de 10 a 20 años de ambos sexos del 1° al 5° de secundaria. Se utilizó un cuestionario (validez 86% y confiabilidad 87.6%) y una Escala de Actitudes (validez 88% y confiabilidad 88.5%). Los datos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS versión 12.0. El 55.1% de estudiantes presentaron conocimientos inadecuados sobre explotación sexual infantil. El 84.4% presentaron actitud de rechazo hacia la explotación sexual infantil. Al asociar los conocimientos sobre explotación sexual infantil con las variables sociodemográficas; se encontró asociación estadísticamente significativa con edad ($\chi^2_c = 40.2$), sexo ($\chi^2_c = 64.2$), nivel de estudio ($\chi^2_c = 175.9$). Al asociar las actitudes hacia la explotación sexual infantil con las variables sociodemográficas, se encontró asociación estadísticamente significativa con edad ($\chi^2_c = 9.62$), sexo ($\chi^2_c = 21.6$).

Palabras clave: violencia sexual- estudiantes.

Título: “Factores psicológicos y socio demográficos asociados al trastorno depresivo en consultorios de psiquiatría y psicología, Hospital Regional de Loreto Iquitos-2006”

Autoras: Vargas Bardales, Danitza I.; Zamora Zumba, Naheed K. y Ruiz Pipa, Juana Del C.

Asesores: Orbe Gaviola Zulema y Jara Ibarra Juan de Dios
Código PS-25-1

Resumen

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la asociación que existe entre los Factores Psicológicos y Sociodemográficos con el Trastorno Depresivo en pacientes atendidos en los consultorios de Psiquiatría y Psicología del Hospital regional de Loreto. Se empleó un diseño descriptivo correlacional. La muestra estuvo constituida por 150 pacientes con diagnóstico de Trastorno Depresivo. Se aplicó un test de autoestima y Apgar Familiar. Los datos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS versión 13. Los hallazgos permitieron describir características psicológicas y sociodemográficos: 100% de pacientes presentaron autoestima baja, 81.3% disfuncionalidad familiar, 46% autoritarismo paterno total, 48% sumisión materna moderada, 51.3% privación/materna ausente, 59.3% fueron menores de edad, 53.3% de sexo femenino, 90.7% con nivel educativo alto, 52% de estado civil inestable. El 49.3% de los pacientes tuvieron trastorno depresivo moderado. Existe relación estadísticamente significativa entre las variables estado civil y ocupación ($p < 0.05$)

Palabras clave: Depresión

Título: “Factores psicosociales relacionados con el inicio precoz de la actividad sexual en adolescentes de 4to y 5to de secundaria de la ciudad de Iquitos 2006”.

Autoras: Gómez Huaymacari, Teresa y Rojas Vásquez, Ana Elena

Asesores: Guerra Vasquez Marina y Jara Ibarra Juan de Dios

Código PS-24-1

Resumen

El presente estudio tiene como finalidad realizar una descripción de algunos Factores Psicosociales que comúnmente están presentes en el entorno de los adolescentes y que son importantes para su desarrollo personal. Se realizó un estudio No experimental de tipo descriptivo en dos Instituciones Educativas: Mariscal Oscar R. Benavides y Rosa Agustina Donayre Morey; de la ciudad de Iquitos-Perú; con el objetivo de establecer el grado de Relación entre los Factores Psicosociales y el Inicio Precoz de la Actividad Sexual en adolescentes de estas dos instituciones educativas. Nuestra muestra estuvo conformada por 264 estudiantes de 4to y 5to de Educación Secundaria del turno de la tarde, en el mes de Julio del 2006. Se comprobó que existe relación directa entre el Autoestima y el Inicio Precoz de la Actividad Sexual ($p < 0.05$)
Palabras clave: adolescencia- sexualidad

Título: “Nivel de conocimiento y conducta sexual en adolescentes de instituciones educativas secundarias mixtas, distrito de Iquitos 2006”.

Autoras: Flores Sosa, Soledad y Guerra Coral, Lizeth

Asesores: Silva Acosta Zoraida y Jara Ibarra Juan de Dios

Código SX-17-2

Resumen

Este estudio determinó la relación entre el nivel de conocimiento sobre salud sexual y la conducta sexual en adolescentes de Instituciones Educativas Secundarias Mixtas, se empleó el método cuantitativo, diseño descriptivo correlacional. A 204 adolescentes entre 15 a 19 años de edad con actividad sexual, se aplicó una ficha de selección y un cuestionario. Los datos fueron procesados en el SPSS 12.0. Los resultados evidenciaron 89.7% tienen nivel de conocimiento adecuado sobre salud sexual; 10.3% conocimiento inadecuado; 57.8% tienen dos o más parejas sexuales, 42.2% (86) una pareja sexual; la edad promedio de inicio de actividad sexual 14-57 años, 65.2% iniciaron actividad sexual tempranamente, 34.8% tardío; 86.3% tienen pareja sexual del sexo opuesto, 12.3% ambos sexo, 1.5% del mismo sexo; 84.8% realizan sus actividades sexuales con protección; 18.6% presentan antecedentes de Infección de Transmisión Sexual. Se concluye que no existe relación entre el nivel de conocimiento sobre salud sexual y la conducta sexual de los adolescentes. No existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y número de pareja sexual, edad de inicio de actividad sexual tipo de pareja sexual, protección durante la actividad sexual y antecedentes de infección de transmisión sexual.

Palabra clave: Adolescencia- Sexualidad.

Título: “Factores de riesgo materno y complicaciones materno perinatales del trabajo de parto en el Hospital Regional de Loreto. Iquitos-2006”

Autoras: Díaz Del Castillo Ruth M.; Da Silva Vásquez, Mary L. y Angulo Pereyra, Rossmery

Asesores: Vilchez Ramirez Ruth y Avila Zavaleta Wilson

Código MI- 73-2

Resumen

Con el objetivo de establecer la relación entre los factores de riesgo materno y las Complicaciones Materno (Hemorragia, Ruptura Uterina, Desprendimiento Prematuro de Placenta, Cesárea y Desgarro del Periné) Perinatales (Sufrimiento Fetal, Parto Mediante Vacum y Asfixia Neonatal) del trabajo de parto, se ejecutó un estudio no experimental de tipo correlacional transversal. Muestra de 264 puérperas, seleccionadas por conveniencia. La técnica de recolección de datos fue la encuesta para aplicar un cuestionario estructurado elaborado por las investigadoras (validez 93% y confiabilidad 87%). Los datos se analizaron a través del paquete estadístico SPSS versión 13.0. El 65.5% son puérperas con edad optima (20-34 años), 52.7% puérperas con paridad optima (1-3 hijos), 77.7% puérperas con intervalo intergenésico no optima (menos de 24 meses y mayor de 36 meses); de las cuales 21.96% presentaron Complicaciones Maternas, 23.48% neonatos de estas puérperas presentaron Complicaciones Perinatales. Se encontró relación estadísticamente significativa sólo entre las variables Paridad vs. Parto mediante Vacuum $X^2_c = 3.889$, $p=0.054$, $gl=1$; Intervalo Intergenésico vs. Hemorragia $X^2_c = 3.635$, $p=0.057$, $gl=1$; Intervalo Intergenésico vs. Asfixia Neonatal $X^2_c = 5.53$, $p=0.019$, $gl=1$.

Palabras clave: Complicaciones maternas y perinatales.

Título: “Características sociodemográficas y nivel de percepción de la calidad de atención del profesional de enfermería del paciente egresado de cirugía, Hospital Iquitos. 2006”

Autores: Coral Panduro, Luis F.; Reyna Flores, Ofelia J. y Saldaña Dávila, Roberto A.

Asesores: Silva Acosta, Zoraida y Zapata Vázquez, Eliseo

Código MI-72-2

Resumen

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar si existe relación entre las características sociodemográficas y el Nivel de Percepción de la Calidad de atención del Profesional de Enfermería en pacientes egresados de Cirugía del Hospital Cesar Garayar García de Iquitos durante el año 2006. El método empleado fue el Multimetódico. El diseño fue el descriptivo correlacional, de corte transversal. La población estudiada estuvo conformada por 1632 pacientes egresados del servicio de cirugía en el año 2005 y la muestra lo constituyeron 70 pacientes egresados que cumplieron los criterios de inclusión y que fueron seleccionados por conveniencia. La técnica empleada fue la Entrevista y los instrumentos fueron la ficha para identificar características sociodemográficas y el cuestionario para determinar el nivel de percepción de la calidad de atención del profesional de enfermería mediante el modelo Servqual. El instrumento tuvo una validez del 95.3% y una confiabilidad del 76.3% determinado a través del coeficiente de confiabilidad de Alfa de Crombach en una prueba piloto de 15 pacientes egresados.

Palabras clave: calidad de atención- enfermería

Título: “Factores maternos, perinatales y Sepsis Neonatal en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Regional de Loreto. Iquitos- 2006”

Autoras: Lomas Labajos, Mercedes I.; Perdomo Rodríguez, Gloria M.Y Vargas Rodríguez, Martha N.

Asesores: Silva Acosta, Zoraida

Código MI-72-2

Resumen

El presente estudio de investigación tuvo como finalidad determinar la relación que existe entre los Factores Maternos, Perinatales y Sepsis Neonatal en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional de Loreto. El método fue Cuantitativo, diseño No Experimental de tipo Descriptivo Correlacional retrospectivo. Se estudió a 118 Recién nacidos con Diagnóstico de Sepsis Neonatal, hospitalizados en el periodo de un año. Se utilizó una lista de chequeo (validez 90%). Los resultados fueron sometidos a la prueba estadística inferencial no Paramétrica Chi-cuadrada (X^2), para determinar la recolección entre las variables, obteniéndose que no existe relación estadísticamente significativa entre siguientes los factores maternos perinatales y la sepsis neonatal precoz: Edad Materna $X^2_c=0.947$, $p=0.623$; Ruptura Prematura de Membrana $X^2_c=0.01$, $p=0.89$; líquido Amniótico $X^2_c=2.103$, $p=0.147$; Tipo de Parto $X^2_c=2.671$; $p=0,102$; Infección del Tracto Urinario $X^2_c=1.069$; $p=0.301$; Peso al Nacer $X^2_c=0.14$; $p=0.709$; Edad Gestacional $X^2_c=0.947$, $p=0.623$; Asfixia $X^2_c=2.310$; $p=0.129$; Sexo $X^2_c=2.310$; $p=0.129$, $a=0.05$, $df=1$.

Palabras clave: sepsis neonatal

Título: Factores intrínsecos–extrínsecos y caídas del adulto mayor atendidos en el Hospital Regional de Loreto”.

Autores: García Reátegui, Sergio y Céspedes Isla, Rossmery

Asesores: Silva Acosta Zoraida

Código GRT-7-2

Resumen

El presente estudio tuvo como finalidad determinar la relación que existe entre los Factores Intrínsecos – Extrínsecos relacionados a las caídas de adultos mayores. Descriptivo correlacional, la muestra constituyeron 55 adultos mayores usuarios del programa del adulto mayor del Hospital Regional de Loreto. Para la recolección de datos se utilizó una ficha de caracterización y la escala de Tinnetti, Mini Examen Cognitivo o MEC de Lobo. El 50.9% son adultos mayores de menor edad (60 y 70 años) 49.1% son de mayor edad (71 y 89 años); 87.3% de sexo femenino; 12.7% de sexo masculino; presencia de las alteraciones musculares en 47.3%; presencia de alteraciones cognitivas en 47.3%, consumen fármacos 54.5%, 30.9% entorno arquitectónico inapropiado; 18.2% presentaron elementos de uso personal inapropiado, 60% de adultos mayores presentaron caídas. Existe relación estadísticamente significativa entre los factores intrínsecos–extrínsecos caídas en adultos mayores según clasificación: Alteración de la marcha y caídas: $X^2=13.750$ $gl=1$ $\alpha=0.05$ $p=0.000$. Alteraciones artromusculares y caídas: $X^2=32.874$ $gl=1$ $\alpha=0.05$ $p=0.000$, alteraciones cognitivas y caídas: $X^2=32.874$ $gl=1$ $\alpha=0.05$ $p=0.000$, Uso de fármacos y caídas: $X^2=44.000$ $gl=1$ $\alpha=0.05$ $p=0.000$, Entorno arquitectónico y caídas: $X^2=16.404$ $gl=1$ $\alpha=0.05$ $p=0.000$, Uso de elementos personales y las caídas: $X^2=18.333$ $gl=1$ $\alpha=0.05$ $p=0.000$.

Palabras clave: adulto mayor- caídas

Título: “Nivel de conocimiento y actitud sobre la anticoncepción oral de emergencia en adolescentes de colegios secundarios, Iquitos – 2006”

Autoras: Mora Hirene, Denise L.; López Pacaya, Rosario de J. y Ruiz Revoredo, Lizbeth

Asesores: Panduro Bartra Adilia

Código PF-8-2

Resumen

Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el Nivel de Conocimiento y la Actitud Sobre la Anticoncepción Oral de Emergencia en Adolescentes de Colegios Secundarios. Diseño descriptivo transversal correlacional, la Muestra estuvo conformada por 248 adolescentes del quinto año de secundaria turno mañana que pertenecen a 09 Instituciones Educativas ubicadas en la zona urbana del Distrito de Iquitos, determinado mediante el Muestreo Aleatorio Estratificado Proporcional. Los instrumentos: Prueba objetiva y el Test tipo Likert con 20 ítems y 21 ítems respectivamente (confiabilidad 80% y validez 70%). Se encontró que 56.0% de los Adolescentes presentaron un Nivel de Conocimiento Inadecuado; 55.6% de los adolescentes presentaron un Nivel de Actitud de Rechazo. Al relacionar las variables en estudio se encontró que existe relación estadísticamente significativa entre el Nivel de Conocimiento y el Nivel de Actitud de los Adolescentes ($X^2 C = 8.25, p = 0.004$).

Palabras clave: Anticoncepción oral- adolescencia

Título: “Factores de riesgo relacionado al nivel de conocimiento sobre sífilis y gonorrea en adolescentes del AA. HH Ciudad Jardín, Iquitos - 2006”.

Autores: González García, Olivia; Mera Chávez, Mitzi V. y Olórtegui Ruiz Jaime.

Asesores: Gutierrez Chavez Juana y Zapata Vasquez Eliseo
Código SX-16-1

Resumen

Con el objetivo de determinar los factores de riesgo socio demográficos relacionados al nivel de conocimiento sobre Sífilis y Gonorrea en adolescentes. Se aplicó un diseño de tipo descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 171 adolescentes del AA. HH Ciudad Jardín, del Distrito de Belén, determinada mediante muestreo probabilístico aleatorio simple. Los instrumentos fueron el Cuestionario para medir nivel de conocimiento sobre Sífilis y Gonorrea elaborado por los investigadores el cual fue validado por Juicio de Expertos y sometido a prueba piloto en 21 Adolescentes (excluidos de la muestra) obteniéndose una validez de 80.7% y una confiabilidad de 72%; Además se aplicó el Apgar Familiar, (validez 85%, confiabilidad 82%). Los datos se analizaron a través del paquete SPSS versión 13 para Windows 2000, se trabajo con un 95% de confiabilidad y $\alpha = 0.0$. Los hallazgos mostraron que existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y algunos factores socio demográficos como: edad $p = 0.000$, grado de instrucción $p = 0.000$, uso del condón $p = 0.001$, comportamiento sexual $p = 0.001$, Fuente de Infección $p = 0.038$, consumo de alcohol y drogas $p = 0.032$.

Palabras clave: ITS- conocimientos.

Título: “Nivel de conocimiento relacionado al Autocuidado de mujeres en peri menopausia de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos 2006”

Autoras: Flores Salas, Marlodys; Lozano Vega Evelyn Fiorella y Pinchez Torres Patricia

Asesores: Gutierrez Chavez Juana y Zapata Vasquez Eliseo
MI-74-2

Código

Resumen

Con la finalidad de determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la actitud frente a las prácticas de autocuidado durante la perimenopausia en mujeres docentes y administrativas de la Universidad Nacional de la Amazonía PeruanaEl método empleado fue el cuantitativo y diseño no experimental descriptivo-correlacional. La muestra estuvo constituida por 117 mujeres en etapa de perimenopausia que laboran en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, determinando mediante el muestreo probabilístico aleatorio simple, se aplicó la fórmula de poblaciones finitas. Los instrumentos utilizados fueron: Cuestionario validez de 93.4% confiabilidad de 0.89 Y una Escala de prácticas de autocuidado, validez 99.1% y confiabilidad 0.89. Para el análisis de datos se utilizó el paquete SPSS versión 13.0. El 70.1% nivel de conocimiento adecuado, respecto a la actitud frente al autocuidado fue de 77.8% actitud positiva. Entre el nivel de conocimiento y la actitud frente a las prácticas de autocuidado en etapa de perimenopausia, se encontró que no existe relación estadísticamente significativa.

Palabras clave: Autocuidado-mujer-menopausia