

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA**  
**INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN**



**“CONOCIMIENTO EN VIH/SIDA Y COMPORTAMIENTO  
SEXUAL EN ESTUDIANTES DE LA UNAP,  
IQUITOS -2009”**

**AUTORES:**

Perla Magnolia Vásquez Da Silva, Matilde Rojas García, Rossana Torres Silva  
Nelly Salazar Becerril, Haydee Alvarado Cora, Carmen Díaz Martinez, Luz  
Avelina Cubas Pérez, Licenia Montes Vásquez, Ángela Rodríguez Gómez  
Zulema Sevillano Bartra y Nicanor Arriola Iglesias

2010

## CONOCIMIENTO EN VIH/SIDA Y COMPORTAMIENTO SEXUAL EN ESTUDIANTES DE LA UNAP, IQUITOS 2009

Perla Magnolia Vásquez Da Silva, Matilde Rojas García, Rossana Torres Silva, Nelly Salazar Becerril, Haydee Alvarado Cora, Carmen Díaz Martínez, Luz Avelina Cubas Pérez, Licenia Montes Vásquez, Ángela Rodríguez Gómez Zulema Sevillano Bartra y Nicanor Arriola Iglesias

### RESUMEN

El presente estudio trata de Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y comportamiento sexual en estudiantes del 1er. Nivel de las 13 facultades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de la ciudad de Iquitos durante el periodo 2009. Cuyo alcance es llevar a la práctica estrategias preventivas. El tipo de estudio es descriptivo correlacional, realizado en una muestra de 286 estudiantes, Para el efecto de la recolección de datos se seleccionó como técnicas la encuesta y test, y como instrumentos: Cuestionario de conocimiento y test tipo Likert. Los resultados muestran: 83.6% tienen edades de 17 a 20 años, seguido del grupo de 21 a 24 años (10.1%). Siendo 52.4 % del sexo masculino y, 47.6 % del sexo femenino, su estado civil 96.2% solteros, 2.1% casados y, 1.7% convivientes. 62.6% evidencian adecuados conocimientos sobre VIH/SIDA y 37.4% inadecuado conocimiento. 61.8% del grupo constituido por mujeres refieren tener conducta sexual de bajo riesgo y, del grupo de varones, 76% también refieren conducta sexual de bajo riesgo, pero 11.8% y 15.3% tanto en mujeres como en varones respectivamente refieren tener una conducta sexual de alto riesgo. 69.2% evidencian inadecuado conocimiento sobre VIH/SIDA y refieren conducta sexual de alto riesgo, 64.1% evidencian adecuado conocimiento sobre VIH/SIDA y, refieren conducta sexual de bajo riesgo y, 81.6% evidencian adecuado conocimiento sobre VIH/SIDA y refieren conducta sexual sin riesgo. Se aplicó la prueba  $\chi^2$ , obteniéndose  $\chi^2_c = 24.657$   $p = .000$  el que nos permite aceptar la hipótesis planteada.

Palabras clave: Conocimiento, comportamiento, sexualidad, jóvenes.

---

<sup>1</sup> Licenciadas en Enfermería, Docentes adscritas al Departamento de Ciencias Psicosociales de la Facultad de Enfermería de la UNAP. Pje. Dina Límaco N° 186.

## **KNOWLEDGE OF HIV/AIDS AND SEXUAL BEHAVIOUR OF UNAP STUDENTS, IQUITOS 2009**

Perla Magnolia Vásquez Da Silva, Matilde Rojas García, Rossana Torres Silva, Nelly Salazar Becerril, Haydee Alvarado Cora, Carmen Díaz Martínez, Luz Avelina Cubas Pérez, Licensia Montes Vásquez, Ángela Rodríguez Gómez Zulema Sevillano Bartra y Nicanor Arriola Iglesias

### **ABSTRACT**

This study attempts to determine the relationship between the level of knowledge and sexual behavior among students from 1st. Level of the 13 faculties of the National University of the Peruvian Amazon in the city of Iquitos, during 2009. The aim of the study is to implement preventive strategies. The type of study is descriptive correlational, conducted on a sample of 286 students.

For the effect of data collection, the techniques selected were the survey and test, and as instruments: a questionnaire of knowledge and a Likert test. The results showed: 83.6% are aged between 17 to 20 years old, followed by the group of 21 to 24 years old (10.1%). Being 52.4% male and 47.6% female, marital status, 96.2% single, 2.1% married and 1.7% cohabiting.

62.6% demonstrate adequate knowledge of HIV / AIDS and 37.4% inadequate knowledge. 61.8% of the group consisting of women report having low-risk sexual behavior and from the male group, 76% also report low-risk sexual behavior, but 11.8% and 15.3% in both, women and men respectively, refer to have a high risk sexual behavior.

69.2% demonstrate inadequate knowledge about HIV/AIDS and refer high-risk sexual behavior, 64.1% show adequate knowledge about HIV / AIDS and refer low-risk sexual behavior and 81.6% show adequate knowledge about HIV / AIDS and report sexual behavior without risk. The  $X^2$  test was applied, obtaining  $x^2_c = 24,657$   $p = .000$  which allows us to accept the hypothesis.

**Keywords:** Knowledge, behavior, sexuality, young people.

## INTRODUCCIÓN

Los adolescentes al ingreso a la Universidad ocurre durante su proceso de crecimiento y desarrollo, condición que los diferencia completamente de los estudiantes adultos. La sexualidad sigue este proceso, que es parte integral de la vida y debe ser considerada dentro del contexto del desarrollo humano.

La sexualidad del adolescente se expresa en sus relaciones con pares, padres, la sociedad en general y también con el adolescente mismo. Particularmente en la adolescencia cobra gran significación por los múltiples y complejos cambios físicos, cognitivos y psicosociales que ocurren en esta etapa, los que determinan significados y formas de expresión diferentes de la sexualidad. Como consecuencia, la sexualidad influye significativamente en el modo de vida de los adolescentes y repercute en la problemática de salud que puede aparecer en ese momento o en las sucesivas etapas del ciclo vital. Resulta impostergable, por lo tanto, considerar la sexualidad en el contexto de la salud integral de los adolescentes, por la repercusión que tiene en el estilo de vida, e incorporar como estrategia de intervención la educación de la sexualidad tempranamente y en el marco de la promoción y prevención continúa de salud a través del ciclo vital.

En Perú, el Ministerio de Salud -MINSA reporta en sus estadísticas 23.446 casos de SIDA y 36.138 de VIH (DGE, Boletín epidemiológico de Setiembre de 2009, [www.dge.gob.pe](http://www.dge.gob.pe)). Sin embargo, según el modelo de estimaciones desarrollado por OMS y ONUSIDA, existen aproximadamente 76.000 personas viviendo con VIH/Sida en el Perú. En Loreto se han registrando hasta 2,017 casos de VIH y 660 casos de Sida. Loreto se ubica a nivel nacional en el quinto lugar de reporte de casos de VIH/Sida, después de Lima, Callao, Arequipa e Ica, aquí se concentra el 10,53% del total nacional. (ONUSIDA Perú. Lucha contra el VIH/Sida\*\* 2010.) La mayoría de los casos de VIH/SIDA proceden de las ciudades y departamentos con mayor concentración urbana de la costa y selva peruana. Lima y Callao concentran el 73% de los casos registrados<sup>1,2</sup>

---

<sup>1</sup> Licenciadas en Enfermería, Docentes adscritas al Departamento de Ciencias Psicosociales de la Facultad de Enfermería de la UNAP. Pje. Dina Límaco N° 186.

Loreto, es una de las provincias con mayor prevalencia de esta enfermedad, considerándose como un problema de salud pública, que se debe afrontar multidisciplinariamente. **Objetivo** Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y comportamiento sexual en estudiantes del 1er. Nivel de las 13 facultades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de la ciudad de Iquitos durante el periodo 2009. **ANTECEDENTES.** LÓPEZ N, y otros (2001), realizaron un estudio descriptivo con 272 mujeres y 186 hombres entre los 15 y 22 años, para establecer las diferencias existentes por sexo en los conocimientos, actitudes y prácticas sexuales en relación con el síndrome de la inmunodeficiencia humana (SIDA), aplicando una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP). El promedio de edad fue similar en ambos grupos. La información sobre SIDA es recibida principalmente por televisión. El nivel de conocimientos (escala: 0-5) tuvo un promedio de 3.6 en mujeres y 3.8 en hombres, con diferencia estadísticamente significativa. Presentaron diferencias estadísticamente significativas las actitudes hacia la disponibilidad de condones, al uso del condón con la pareja estable y la disminución del placer sexual al usar condón. El nivel de riesgo promedio para hombres fue 19.7 y para mujeres 18.1 (escala: 1-85); sólo 2.3% practica sexo seguro<sup>3</sup>.

FLORES F. y LEYVA R. (2003) analizó la representación social sobre el SIDA en un grupo de jóvenes de entre 16 a 23 años de edad, estudiantes de bachillerato, en la Ciudad de México. Seleccionó una escuela preparatoria del sistema de educación pública, ubicada en la Ciudad de México. En ella se realizó una invitación abierta a los estudiantes de todos los ciclos académicos para participar en el estudio, el cual se llevó a cabo durante 1999-2000. Se seleccionaron 46 estudiantes, 28% hombres y 72% mujeres. Se trata de un estudio exploratorio de campo que incluyó tres fases, en las que se abordaron las siguientes dimensiones: cognitiva, aplicando técnicas de asociación libre; campo representacional, a través de entrevistas semi estructuradas; y actitud de contexto, por medio de dos grupos de discusión en los que se utilizó la información recolectada anteriormente como base para la discusión. El núcleo cognitivo sobre el SIDA incluye la asociación entre sexo, enfermedad y muerte. El

---

<sup>3</sup> Licenciadas en Enfermería, Docentes adscritas al Departamento de Ciencias Psicosociales de la Facultad de Enfermería de la UNAP. Pje. Dina Límaco N° 186.

campo representacional del SIDA se construye sobre la unidad transmisión-prevención, donde aparecen vinculados conceptos como virus, contagio, sexo, protección y condón. Se identificó una actitud ambivalente para la prevención y la transmisión del VIH: “mitad depende de nosotros y mitad no”. Los grupos de discusión resaltaron situaciones como “violaciones, transfusiones, jeringas infectadas”, en las que consideran nula su capacidad para prevenir la transmisión, lo cual contribuye a explicar su actitud ambivalente ante la prevención. La utilidad del condón está relacionada con la prevención de embarazos, más que con la prevención de infecciones de transmisión sexual. Concluyeron que la representación social del VIH/SIDA en estudiantes jóvenes constituye un *corpus* multidimensional en el que convergen e interactúan diversos elementos de orden científico y de sentido común, como creencias, mitos, estigmas, miedos, que contribuyen a dar significado al problema denominado SIDA<sup>4</sup>

PIÑA J. et al. (2003), reportó datos de un estudio que contó con una muestra de 445 estudiantes de nivel superior, pertenecientes a dos instituciones de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Se midieron variables psicológicas relacionadas con la práctica de comportamientos de riesgo/prevención de la infección por el VIH, comparando las respuestas de los participantes en función del sexo y de la edad. Las variables incluían los motivos que subyacen tanto a la práctica de comportamientos de riesgo como de prevención, así como las circunstancias sociales que facilitan la práctica de los primeros. Los resultados demuestran que son pocas las variables psicológicas que se ven afectadas por el sexo y la pertenencia a un grupo de edad. Se discute sobre la necesidad de realizar nuevos estudios con el objeto de replicar o rechazar estos hallazgos, sobre todo por la importancia que revisten para el diseño de programas preventivos dirigidos a ese sector de la población<sup>5</sup>.

VERA L. et al. (2004) estudió la asociación entre el área de estudio y los conocimientos y comportamientos respecto a la transmisión del VIH/SIDA en los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Estudio analítico de corte transversal con muestreo estratificado. Encuesta sobre conocimientos y comportamientos relacionados con la transmisión del VIH/SIDA a 213 estudiantes

---

<sup>4</sup> Licenciadas en Enfermería, Docentes adscritas al Departamento de Ciencias Psicosociales de la Facultad de Enfermería de la UNAP. Pje. Dina Límaco N° 186.

de las áreas de estudio de salud, ciencias básicas, ingenierías y humanidades. El análisis estadístico aplicó regresión logística. Se estudiaron 101 mujeres y 112 hombres con edad promedio de 22 años; 13.2% de salud, 27.2% de ciencias básicas, 30.0% de ingenierías y 29.6% de humanidades. La mayoría conoce las vías de transmisión del VIH, 19% no considera que tener relaciones sexuales bajo efecto del alcohol sea práctica riesgosa para adquirirlo; 96% sabe que el condón se debe usar durante toda la relación sexual; 79.8% había tenido relaciones sexuales; sólo 26.4% de ellos dijo usar siempre condón. Los estudiantes de salud obtuvieron el mayor promedio de respuestas correctas con diferencias estadísticamente significativas con respecto a los promedios de los estudiantes de las otras áreas. La asociación entre comportamientos y área de estudio informó, que comparados con los de salud, los estudiantes de humanidades tuvieron un riesgo significativamente mayor de tener comportamientos inadecuados con respecto a la transmisión del VIH. Aunque esta población tiene adecuados conocimientos sobre la enfermedad, presenta comportamientos riesgosos para infectarse con el VIH. Los estudiantes del área de humanidades deben ser objeto de un programa de prevención de infección por VIH orientado a sus características particulares<sup>6</sup>

LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL ROMULO GALLEGOS. (2004) realizó un estudio en España sobre el nivel de conocimiento del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), en 600 homosexuales usuarios de 15 a 40 años de edad que acudían a consulta del Centro Ambulatorio “La Morena”, de San Carlos del Estado de Cojedes; como resultado reporta que los conocimientos satisfactorios sobre el SIDA fue de 35.5% evidenciándose más en los temas relacionados a las actividades de prevención del contagio por VIH/SIDA, mientras que 64.5% tenían conocimientos no satisfactorios<sup>7</sup>

THACKER (2005), en Boston (Estados Unidos) realizó un estudio sobre conductas sexuales de riesgo en 2,932 homosexuales, con la finalidad de estudiar los factores que favorecen la expansión del virus del SIDA. Entre los resultados más significativos sobre conducta sexual encontró lo siguiente: 64% tuvieron relaciones sexuales sin protección, 84% lograron sus parejas sexuales ocasionales mediante el

---

<sup>1</sup> Licenciadas en Enfermería, Docentes adscritas al Departamento de Ciencias Psicosociales de la Facultad de Enfermería de la UNAP. Pje. Dina Límaco N° 186.

uso de Internet, 37% declararon haber tenido más de 100 compañeros sexuales durante su vida y 6% afirmaron haber tenido más de 10 compañeros sexuales al mes. Así mismo refiere que entre los sujetos seropositivos, grupo del que podría deducirse una concientización mayor y evidente sobre el uso de condones por su condición de seropositivo, continúan aún muy bajos (25%)<sup>8</sup>

COLLAZOS M. et. al. (2005) realizaron una investigación denominada “Conocimientos, actitudes y auto percepción del rol docente frente al VIH/SIDA en docentes formadores y alumnos de Institutos Superiores Pedagógicos de Lima Metropolitana”, con el propósito de desarrollar un conjunto de habilidades, capacidades y competencias orientadas a la prevención del VIH/SIDA en los ISP (Institutos Superiores Pedagógicos) del país. El objetivo de la investigación fue identificar algunos aspectos importantes que podrían contribuir a optimizar el despliegue de esfuerzos orientados a enfrentar, controlar y superar los efectos de esta pandemia. Como resultado que de las respuestas obtenidas se puede observar que aproximadamente un 74% de la población evaluada logró obtener un significativo número de respuestas correctas en el área de conocimientos. Es decir que existe un aceptable nivel de conocimientos sobre el VIH/SIDA entre los docentes formadores y sus alumnos, aunque el nivel de los primeros es mejor que el de sus alumnos. A pesar de ello, el porcentaje de desinformación es elevado y existen serias contradicciones y variabilidad en las respuestas. En el área de actitudes alrededor del 70% de los entrevistados manifestó actitudes positivas hacia la enfermedad, superando largamente a quienes declararon en forma abierta actitudes de rechazo o gran temor al contagio<sup>9</sup>

URREA G. et. al. (2006) analizó los comportamientos sexuales e incidencia de los programas de salud sexual y reproductiva en estudiantes de secundaria de sectores populares y de la universidad pública en la ciudad de Cali, Colombia, Con el objetivo de hacer una evaluación cualitativa de los comportamientos o prácticas sexuales, y la incidencia de los programas de salud sexual y reproductiva en los usuarios adolescentes y postadolescentes escolarizados de Cali, Colombia, se llevaron a cabo dos muestras por cuotas, una en colegios de sectores populares de la

---

<sup>1</sup> Licenciadas en Enfermería, Docentes adscritas al Departamento de Ciencias Psicosociales de la Facultad de Enfermería de la UNAP. Pje. Dina Límaco N° 186.

ciudad y otra en la Universidad del Valle (UNIVALLE). Además, se realizó un número limitado de doce entrevistas abiertas en dos grupos de población estudiantil diferentes, colegios y universidad. El estudio aborda los comportamientos sexuales de adolescentes y postadolescentes, los métodos anticonceptivos y prevención de ETS y VIH/SIDA, y los usos de los programas de salud sexual y reproductiva que ambas poblaciones hacen, controlando los factores de clase social (estrato socioeconómico), género y raza. Dos programas de salud sexual y reproductiva se tomaron de referencia: el de PROFAMILIA (Asociación Pro-Bienestar de la Familia Colombiana), y el programa de salud sexual y reproductiva del Servicio Médico Universitario de la UNIVALLE. Los resultados muestran cómo los comportamientos y las respuestas a los programas de salud sexual y reproductiva están mediados por las múltiples categorías sociológicas que orientan el análisis<sup>10</sup>

MACAN, Marwaan. (2006), realizó en Tailandia, un estudio en 100 homosexuales atendidos en el centro médico y de Investigación TREAT, sobre el comportamiento sexual, encontró que, 28% son portadores del VIH, 12% usaron consistentemente preservativos y 50% nunca lo usarán. el 70% creían que corren poco riesgo de contagiarse con el VIH. Además concluye que 50% tienen sexo con mujeres, los que constituyen la población puente para la infección de VIH. Por otro lado hace referencia sobre la falta de campañas educativas dirigidas específicamente a los homosexuales<sup>11</sup>

JUNCO, Xiomara. (2006), en Cuba, realizó un estudio sobre el nivel de conocimiento de VIH/SIDA y la conducta sexual en 150 homosexuales, usuarios de 12 a 17 años de edad que acudían a consulta del “Policlinico Cerro”, encontró que 91.6% tuvieron un nivel de conocimiento no adecuado sobre VIH/SIDA y 8.4% tuvieron conocimiento adecuado. Por otro lado reportó que 58.3% tuvieron conducta sexual de alto riesgo y 41.7% de bajo riesgo y 25% habían recibido información sobre este tema a través del sector salud. Al contrastar la hipótesis de estudio encontró asociación estadística significativa ( $p < 0.05$ ) entre el conocimiento de VIH/SIDA y la conducta sexual en homosexuales<sup>12</sup>

---

<sup>1</sup> Licenciadas en Enfermería, Docentes adscritas al Departamento de Ciencias Psicosociales de la Facultad de Enfermería de la UNAP. Pje. Dina Límaco N° 186.

LIGHTFOOT (2007) en la Universidad de los Angeles (California – EE.UU.), realizó un estudio sobre conocimiento de VIH/SIDA y comportamiento sexual en 545 homosexuales de 19 a 69 años de edad. En el cual encontró que 88% tenían estudios secundarios realizados en la preparatoria, por otro lado el 12% tenían estudios universitarios. Al analizar el comportamiento sexual de los sujetos de estudio encontró que 65% afirmaron tener varios compañeros sexuales y 35% haber mantenido relaciones sexuales sin protección. Así mismo, al analizar cuanto conocían sobre las medidas de prevención del VIH/SIDA, solo 25% tuvieron conocimiento satisfactorio sobre el VIH/SIDA, modo de transmisión, tratamiento, diagnóstico y medidas de prevención. En el análisis bivariado reporta asociación estadística significativa entre el conocimiento sobre VIH/SIDA y el comportamiento sexual habiendo obtenido  $p = 0.0000$ , con 1 grado de libertad (gl) y un nivel de confianza del 95%.<sup>13</sup>

## MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio transversal, es de tipo cuantitativo, diseño descriptivo correlacional.

**Población y muestra.** La población fue 1200 cuya muestra 286 estudiantes del primer nivel de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana durante el año 2009 en trece Facultades, **Técnicas e instrumentos.** Se aplicó como técnica la encuesta y test, como instrumentos el cuestionario y guía. **Procedimiento de recolección.** Los datos se obtuvieron de fuentes primarias, mediante la aplicación de los instrumentos tanto de conocimiento como de la conducta sexual, a los sujetos de la muestra, de la siguiente manera: Se realizó una prueba piloto en estudiantes de primer nivel de la Universidad Científica del Perú Se solicitó autorización a los Decanos de las 13 Facultades para conocer el horario. Se aplicó dichos instrumentos en las aulas de las unidades de análisis. **Análisis de datos.** Después de obtenida los datos, se procesaron los datos para el análisis y discusión de los resultados, se utilizó el programa SPSS-15 y, en ella la prueba Chi cuadrado para así establecer la asociación existente entre ambas variables. **Aspectos bioéticas.** Participación de los Sujetos de la Muestra: En el proyecto se tuvo la participación activa de todos los alumnos del primer nivel de las 13 facultades en estudio. **Aspectos de Bioseguridad:** La recolección de datos, evaluación, análisis de los resultados y difusión de los mismos están a cargo de todos los investigadores, cuyos resultados se garantiza el anonimato para que no se ponga en riesgo la identidad de los sujetos de la muestra.

## RESULTADOS

**TABLA N° 1**  
**CARACTERÍSTICAS EN TÉRMINO DE EDAD, SEXO Y ESTADO CIVIL**  
**DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAP-2009**

CARACTERÍSTICAS		N°	%
<b>EDAD</b>	Menor de 17 años	11	3.8
	De 17 a 20 años	239	83.6
	De 21 a 24 años	29	10.1
	De 25 a más años	7	2.4
<b>TOTAL</b>		<b>286</b>	<b>100.0</b>
<b>SEXO</b>	Femenino	136	47.6
	Masculino	150	52.4
<b>TOTAL</b>		<b>286</b>	<b>100.0</b>
<b>ESTADO CIVIL</b>	Soltero	275	96.2
	Casado	6	2.1
	Conviviente	5	1.7
<b>TOTAL</b>		<b>286</b>	<b>100.0</b>

Característica en término de edad, sexo y estado civil de los estudiantes de la UNAP - 2009

**TABLA N° 2**  
**NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA EN LOS**  
**ESTUDIANTES DE LA UNAP - 2009.**

Conocimiento	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Adecuado conocimiento	179	62.6
Inadecuado conocimiento	107	37.4
<b>TOTAL</b>	<b>286</b>	<b>100.0</b>

**TABLA N° 3**  
**COMPORTAMIENTO SEXUAL DE LOS ESTUDIANTES**  
**DE LA UNAP - 2009**

COMPORTAMIENTO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Alto Riesgo	39	13.6
Bajo Riesgo	198	69.2
Sin Riesgo	49	17.1
<b>TOTAL</b>	<b>286</b>	<b>100.0</b>

**TABLA N° 4**  
**NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE VIH/SIDA SEGÚN SEXO DE**  
**LOS ESTUDIANTES DE LA UNAP - 2009.**

SEXO	CONOCIMIENTO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
FEMENINO	Adecuado conocimiento	91	66.9
	Inadecuado conocimiento	45	33.1
	<b>TOTAL</b>	<b>136</b>	<b>100.0</b>
MASCULINO	Adecuado conocimiento	88	58.7
	Inadecuado conocimiento	62	41.3
	<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>100.0</b>

**TABLA N° 5**  
**CONDUCTA SEXUAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA**  
**UNAP SEGÚN SEXO - 2009**

<b>SEXO</b>		<b>FRECUENCIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>
FEMENINO	Alto Riesgo	16	11.8
	Bajo Riesgo	84	61.8
	Sin Riesgo	36	26.5
	<b>TOTAL</b>	<b>136</b>	<b>100.0</b>
MASCULINO	Alto Riesgo	23	15.3
	Bajo Riesgo	114	76.0
	Sin Riesgo	13	8.7
	<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>100.0</b>

**TABLA N° 06**  
**NIVEL DE CONOCIMIENTO Y COMPORTAMIENTO SEXUAL EN**  
**ESTUDIANTES DE LA UNAP - 2009**

<b>CONOCIMIENTO/COMPOR TAMIENTO</b>	<b>CONDUCTA</b>			
	<b>ALTO RIESGO</b>	<b>BAJO RIESGO</b>	<b>SIN RIESGO</b>	<b>TOTAL</b>
Adecuado conocimiento	12	127	40	179
	30.8%	64.1%	81.6%	62.6%
Inadecuado conocimiento	27	71	9	107
	69.2%	35.9%	18.4%	37.4%
<b>TOTAL</b>	39	198	49	286
	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

## DISCUSIÓN

Luego de trabajar con una muestra de 286 estudiantes del primer nivel, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana los resultados de la investigación y mostraron en la tabla 1: 83.6% tienen edades de 17 a 20 años, seguido del grupo de 21 a 24 años (10.1%) Siendo 52.4 % del sexo masculino y, 47.6 % del sexo femenino. En concordancia con los resultados encontrados por ANDINA L., et al. 2004. Obtuvieron una tasa de respuesta del 46% (124 / 266), con una edad promedio de 20,6 años (DS  $\pm 4,7$ ), y un predominio de 93% (116/124) de población masculina<sup>14</sup>.

Estado civil 96.2% solteros, 2.1% casados y, 1.7% convivientes Existe cierta semejanza con los resultados encontrados por Alberto F Leonil, et al.2005. Estaban casados 3 % de los estudiantes de 1° año 8,4% de los de 3° año y 12,4% de los de 6° año; los restantes eran solteros (92.4%). En esta Institución realizaron dicha investigación en todos los niveles de estudio. Aún así existe semejanza en la proporción de solteros<sup>15</sup> 62.6% evidencian adecuados conocimientos sobre VIH/SIDA y. 37.4% inadecuado conocimiento. No existe concordancia con la investigación de Alberto F Leonil, et al.2005. La mayoría de los estudiantes no distingue entre el VIH y el SIDA; 69 % piensa que es lo mismo decir VIH que SIDA; mientras que 64,2 % sostiene que toda persona VIH positivo tiene SIDA. Por lo tanto tienen deficiente conocimiento sobre VIH/SIDA<sup>15</sup>.

Referente al Comportamiento sexual de Alto riesgo 13.6%, bajo riesgo 69.2%, sin riesgo 17.1% La mayoría (68,2%) Existe concordancia con los resultados obtenidos por Dessunti<sup>1</sup> y Advincula R<sup>1</sup> **2007**, Durante toda su vida, el número de compañeros sexuales mencionado por los estudiantes de la UEL varió de 1 a 15, siendo la media general de 3,07 (DP=2,42) compañeros para los alumnos de primer año y 3,42 (DP=3,26) para los del último año. La mayoría (68,2%) refirió haber tenido relación con 2 o más personas en este periodo, no existiendo diferencia significativa entre el año de graduación y la carrera. Para mejor evaluación de este indicador, se podría establecer la proporción existente entre el número de compañeros y el tiempo vivido (edad). Siendo así, nuestra muestra tiene una concentración mayor entre 17 y 25 años de edad<sup>16</sup>.

---

<sup>1</sup> Licenciadas en Enfermería, Docentes adscritas al Departamento de Ciencias Psicosociales de la Facultad de Enfermería de la UNAP. Pje. Dina Límaco N° 186.

Del 100% de sujetos de la muestra, 61.8% del grupo constituido por mujeres refieren tener conducta sexual de bajo riesgo y, del grupo de varones, 76% también responden conducta sexual de bajo riesgo, pero 11.8% y 15.3% tanto en mujeres como en varones respectivamente refieren tener una conducta sexual de alto riesgo. Existe discrepancia con resultados obtenidos por ESCALANTE-R, LORENA<sup>1</sup> et al. En las conductas sexuales evaluadas comparadas en ambos sexos es el sexo masculino el que presenta mayores conductas de riesgo; la promiscuidad es elevada en ellos 40.91% (n=27) con respecto a las mujeres, 12.24% (n=6) con diferencia estadísticamente significativa (Test exacto de Fisher p=0.001)<sup>17</sup>.

Del 100% de sujetos de la muestra, 69.2% evidencian inadecuado conocimiento sobre VIH/SIDA y refieren conducta sexual de alto riesgo, 64.1% evidencian adecuado conocimiento sobre VIH/SIDA y, refieren conducta sexual de bajo riesgo y, 81.6% evidencian adecuado conocimiento sobre VIH/SIDA y refieren conducta sexual sin riesgo. Para probar la hipótesis planteada, se aplicó la prueba no paramétrica  $\chi^2$  con 95% de confianza. Con un error de alfa 0.05, 2 grados de libertad, obteniéndose  $\chi^2 = 24.657$  p= .000 el que nos permite aceptar la hipótesis planteada. Resultado que no concuerda con el trabajo de Ramos Durand, Bertha; Orllana Lima, Luis; Escalona, Jesús; Gutiérrez, Víctor. 1995. El nivel de conocimientos detectado fue regular sobre la forma de transmisión del SIDA, bueno con respecto al reconocimiento de los grupos de alto riesgo y deficiente con respecto a las medidas preventivas de la enfermedad. No hubo correlación entre el nivel de conocimientos y el comportamiento sexual<sup>18</sup>.

---

<sup>1</sup> Licenciadas en Enfermería, Docentes adscritas al Departamento de Ciencias Psicosociales de la Facultad de Enfermería de la UNAP. Pje. Dina Límaco N° 186.

## CONCLUSIONES

Luego del tratamiento y análisis de los datos, nos permite llegar a las siguientes conclusiones:

1. Dentro de las características de la nuestra tenemos: 83.6% presentan edades de 17 a 20 años, 10.1% de 21 a 24 años, 3.8% menor de 17 años y, 2.4% de 25 a más años. 52.4% son del sexo masculino, 47.6% del sexo femenino. 96.2% son solteros, 2.1% casados y, 1.7% convivientes. La tendencia a la iniciación sexual a menor edad, una insuficiente información sobre sexualidad y sobretodo en la prevención de las ITS, muestran a nuestra población como susceptible a padecer enfermedades relacionadas con el sexo y las consecuencias de las mismas.
2. El 62.6% de unidades de análisis, evidenciaron adecuados conocimientos sobre VIH/SIDA y, 37.4% inadecuado conocimiento. Existe una mayor información preuniversitaria, en este tipo de enfermedades, en los cursos inferiores, muy probablemente debido a la mayor concientización de nuestra sociedad.
3. El 69.2% de sujetos de la muestra, refieren comportamiento sexual de bajo riesgo, 13.6% de alto riesgo y, 17.1% refieren tener un comportamiento sexual sin riesgo.
4. Existe relación entre el mayor conocimiento sobre VIH y, menor comportamiento de riesgo sexual.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. MAZZETTI P. 2004 Recomendaciones para la Implementación de un Programa de Terapia Antirretroviral para el VIH/SIDA en el Perú
2. Oficina General de Epidemiología - Ministerio de Salud - 2008.
3. LÓPEZ N, y otros. 2001. Diferencias en los conocimientos, actitudes y comportamientos sexuales relacionados con el SIDA, entre hombres y mujeres jóvenes de Bucaramanga. Revista Colombia Médica CORPORACIÓN EDITORA MÉDICA DEL VALLE ISSN: 1657-9534 VOL. 32, NUM. 1, PP. 32-40
4. FLORES F. y LEYVA R. 2003. Representación social del SIDA en estudiantes de la ciudad de México. Artículo científico. División de estudios de Posgrado.Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. México, DF. México.p.1.
5. PIÑA J. et al. 2003. Variables Psicológicas y VIH/SIDA en estudiantes de nivel superior: Estudio comparativo en función del sexo y la edad. Secretaría de Salud del Estado de Sonora, México. Universidad de Sonora, México.p.1.
6. VERA L. et al.2004. Asociación entre el área de estudio y los conocimientos y comportamientos frente a la transmisión del VIH/SIDA en los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Revista Colombia Médica CORPORACIÓN EDITORA MÉDICA DEL VALLE ISSN: 1657-9534 VOL. 35, NUM. 2, 2004,PP. 62-68.
7. UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL ROMULO GALLEGOS. 2004. NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA.P. 8.
8. TRACKER. Jhon y otro (2005-2007) conductas sexuales de riesgo entre homosexuales estudiados unida-pp. 10-11.
9. COLLAZOS, Maria y Otros (2005) a VIH/SIDA con mujeres.  
[www:http://www.ops.orgbo/its-vih.sida](http://www.ops.orgbo/its-vih.sida).
10. URREA.G et al. 2006. Comportamientos sexuales e incidencia de los programas de salud sexual y reproductiva en estudiantes de secundaria de sectores populares y de la Universidad pública en la ciudad de Cali, Colombia. Artículo científico. P.209.

11. MACAN, Mar Wear (2006) Centros Médicos y de investigación. Práctica de Asia Tailandia P.9.
12. JUNCA, XiomARA (2006) Nivel de Conocimiento de VIH/SIDA y la Conducta Sexual en Hombre que tienen sexo con hombres.
13. LIGHTFOOT, Margarita. (2007) Modificación de la Conducta Sexual de pacientes con VIH/SIDA escala unidades P-1.
14. Andina L., Cacace PJ, Casares F., Font G., Coppolillo FE, Gimenez Lascano G., Orsei S., Begué C., Goñi I., Rau A., Espinosa M., Pace N., Carrizo J., Lopez Rodríguez A. . 2005. Evaluación de comportamientos sexuales de riesgo en una población universitaria de la Provincia de Buenos Aires. Volumen 1 Número 3.
15. Alberto F Leoni<sup>1</sup>, Gladys I Martelloto<sup>2</sup>, Ernesto Jakob<sup>3</sup>, Julio E Cohen<sup>4</sup>, César I Aranega<sup>5</sup> .CONDUCTAS SEXUALES Y RIESGO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA *DST – J bras Doenças Sex Transm 17(2): 93-98, 2005.*
16. Elma Mathias Dessunti<sup>1</sup>; Alberto Olavo Advincula Reis<sup>II</sup> Factores psicosociales y comportamentales asociados al riesgo de ETS/SIDA entre estudiantes del área de la salud<sup>1</sup> 2007 **Rev. Latino-Am. Enfermagem vol.15 no.2 Ribeirão Preto Mar./Apr. 2007**doi: 10.1590/S0104-11692007000200012
17. Escalante-Romero, Lorena<sup>1</sup>, Cerrón-Vela, Carmen Rosa<sup>1</sup>, Salazar-Granara, Alberto<sup>2</sup>, Mezones-Holguín, Edward 3.. Descripción De La Conducta Sexual En Adultos Jóvenes Limeños. Revista Horizonte Médico Volumen 8, N°1, Julio 2008.
18. Durand, Bertha; Orllana Lima, Luis; Escalona, Jesús; Gutiérrez, Víctor Nivel de conocimientos y comportamiento sexual frente a la prevención del sida. 1995. LILACS. 391323.